

商品名 ゴラデックスLA10.8mgデポ 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	ゴセレリン酢酸塩キット
英名	Zoladex LA depot	剤型	キット類
薬価	34937.00	規格	10.8mg 1筒（ゴセレリンとして）
メーカー	アストラゼネカ	毒劇区分	（劇）

ゴラデックスLA10.8mgデポの効能・効果

前立腺癌、閉経前乳癌

ゴラデックスLA10.8mgデポの使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 抗凝固剤投与中、易出血状態	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 閉経前乳癌で骨転移	記載場所	重大な副作用
	注意レベル	注意
4. 前立腺癌で脊髄圧迫による腎障害又はその恐れ・疑い、前立腺癌で尿路閉塞による腎障害又はその恐れ・疑い、閉経前乳癌で骨転移、子宮筋腫	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ゴラデックスLA10.8mgデポの副作用等

1. アナフィラキシー、過敏症状、間質性肺炎、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸、心筋梗塞、脳梗塞、静脈血栓症、肺塞栓症、血栓塞栓症、骨性疼痛、尿路閉塞、排尿困難、脊髄圧迫、糖尿病、糖尿病増悪、心不全、高カルシウム血症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 皮膚そう痒感、勃起力低下、性欲減退、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、貧血、体のほてり、トリグリセライド上昇、発汗、コレステロール上昇、ほてり、月経回復遅延、頭痛、関節痛	記載場所	その他の副作用

3. 血圧変動、高血圧、低血圧、脱毛、乳房腫脹、乳房圧痛、BUN上昇、クレアチニン上昇、蛋白尿、Al-P上昇、LDH上昇、感覚異常、しびれ、幻覚、妄想、気分変動、抑うつ、悪心、嘔吐、骨性疼痛、関節痛、骨塩量低下、白血球減少、血小板減少、注射部位反応、出血、血腫、膿瘍、硬結、疼痛、倦怠感、顔面潮紅、発熱、体重増加、鼻出血、血糖値上昇、下垂体卒中、下垂体腺腫、ざ瘡、乳房緊満、性欲減退、AST上昇、γ-GTP上昇、いらいら感、骨痛、貧血、卵巣嚢胞

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

4. 発疹、排尿困難、食欲不振、浮腫、血圧変動、高血圧、低血圧、蕁麻疹、皮膚そう痒感、脱毛、白帯下、性器出血、腔乾燥感、ALT上昇、めまい、気分変動、抑うつ、頭重感、不眠、感覚異常、しびれ、悪心、骨塩量低下、白血球減少、血小板減少、注射部位反応、出血、血腫、膿瘍、硬結、疼痛、更年期様症状、肩こり、体重増加、トリグリセライド上昇、コレステロール上昇

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

5. 血中テストステロンの一過性上昇、血中エストロジオールの一過性上昇、骨性疼痛の一過性増悪、尿路閉塞、脊髄圧迫、出血、出血性ショック、高カルシウム血症、流産、分娩障害、大量の子宮出血、下腹痛、良性下垂体腺腫

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ゾラデックスLA10.8mgデポの相互作用

1. 薬剤名等：抗凝固剤投与中

発現事象 出血、出血性ショック

投与条件 -

理由・原因 -

指示 慎重投与

