

商品名 ウゴービ皮下注0.25mg SD 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	セマグルチド（遺伝子組換え）キット（3）
英名	Wegovy SD	剤型	キット類
薬価	1923.00	規格	0.25mg 0.5mL 1キット
メーカー	ノボ ノルディスク ファーマ	毒劇区分	(劇)

ウゴービ皮下注0.25mg SDの効能・効果

肥満症

ウゴービ皮下注0.25mg SDの使用制限等

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、糖尿病性前昏睡、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、1型糖尿病、2型糖尿病を有する緊急、2型糖尿病を有する手術、2型糖尿病を有する重症感染症 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 2型糖尿病 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 注意レベル | 注意 |
| 3. インスリン依存状態、2型糖尿病、膵炎の既往、重度胃腸障害、重度胃不全麻痺、低血糖又はその恐れ・疑い、脳下垂体機能不全、副腎機能不全、栄養不良状態、飢餓状態、不規則な食事摂取、食事摂取量不足、激しい筋肉運動、過度のアルコール摂取、甲状腺髄様癌の家族歴、多発性内分泌腫瘍症2型の家族歴、甲状腺髄様癌の既往 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

ウゴービ皮下注0.25mg SDの副作用等

- | | | |
|---|------|--------|
| 1. 胃腸障害 | 記載場所 | 用法・用量 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 低血糖、脱力感、倦怠感、高度空腹感、冷汗、顔面蒼白、動悸、振戦、頭痛、めまい、嘔気、視覚異常、低血糖症状、重篤な低血糖症状、意識消失、膵炎、胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ滞性黄疸 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 3. 急性膵炎、嘔吐を伴う持続的な激しい腹痛 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 5%未満 |

4.	食欲減退、頭痛、悪心、下痢、嘔吐、便秘、消化不良、おくび、腹痛、腹部膨満	記載場所	その他の副作用
5.	糖尿病網膜症、心拍数増加、胃排出遅延、胆石症、アミラーゼ増加	記載場所	その他の副作用
		頻度	頻度不明
6.	胃腸炎、浮動性めまい、味覚不全、腹部不快感、胃食道逆流性疾患、鼓腸、胃炎、胃酸過多、口内乾燥、胃腸障害、注射部位反応、疲労、無力症、早期満腹、倦怠感、脱毛症、不眠症、リパーゼ増加	記載場所	その他の副作用
		頻度	5%未満
7.	胃腸障害、急性膵炎	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
8.	胆石症、胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ滞性黄疸、腹痛、腹部症状	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明
9.	下痢、嘔吐、脱水、急性腎障害、急激な高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病網膜症の顕在化、糖尿病網膜症増悪、胎仔毒性、胚生存率減少、胚発育抑制、胎仔骨格異常、胎仔血管異常、早期妊娠損失、胎仔内臓異常、胎仔外表異常、母動物体重減少、甲状腺C細胞腫瘍	記載場所	使用上の注意
		頻度	頻度不明

ウゴービ皮下注0.25mg SDの相互作用

1.

薬剤名等：セマグルチド含有製剤

発現事象

-

理由・原因

本剤はセマグルチド（遺伝子組換え）を含有

投与条件

-

指示

禁止

2.

薬剤名等：GLP-1受容体に対するアゴニスト作用を有する薬剤

発現事象

-

理由・原因

本剤はセマグルチド（遺伝子組換え）を含有

投与条件

-

指示

禁止

3.

薬剤名等：糖尿病用薬

発現事象

低血糖症

理由・原因

血糖降下作用が増強

投与条件

-

指示

注意

ウゴービ皮下注0.25mg SDの配合変化

1. 薬剤名等：他の製剤			
発現事象	成分が分解	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.