

商品名 レベスティブ皮下注用0.95mg 医薬品基本情報

薬効	2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	一般名	テデュグルチド（遺伝子組換え）注射用
英名	Revestive	剤型	注射用
薬価	18421.00	規格	0.95mg 1瓶（溶解液付）
メーカー	武田薬品	毒劇区分	（劇）

レベスティブ皮下注用0.95mgの効能・効果

短腸症候群

レベスティブ皮下注用0.95mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、胃腸悪性腫瘍、肝胆道系悪性腫瘍、膵臓悪性腫瘍、5年以内に胃腸悪性腫瘍の既往、5年以内に肝胆道系悪性腫瘍の既往、5年以内に膵臓悪性腫瘍の既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 胃腸・肝胆道系及び膵臓以外に悪性腫瘍	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	相対禁止
3. 中等度以上の腎機能障害、クレアチニンクリアランス50mL/min未満	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
4. 高血圧の既往、心血管疾患の既往、心不全の既往、中等度以上の腎機能障害、クレアチニンクリアランス50mL/min未満	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

レベスティブ皮下注用0.95mgの副作用等

1. 大腸ポリープ、十二指腸ポリープ、腸ポリープ、結腸狭窄、小腸狭窄、腸閉塞、消化管ストーマ閉塞、胆嚢炎、急性胆嚢炎、胆管炎、胆石症、胆嚢障害、胆道障害、慢性膵炎、急性膵炎、膵管狭窄、膵感染、膵疾患、体液貯留、うっ血性心不全	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
2. 腹痛、腹部膨満、悪心、嘔吐、注射部位反応、注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位疼痛、消化管ストーマ合併症、消化管ストーマサイズ増大、消化管ストーマ乳頭サイズ増大	記載場所	その他の副作用

3. 過敏症、鼻咽頭炎、インフルエンザ、咳嗽	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>その他の副作用</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	頻度不明
記載場所	その他の副作用				
頻度	頻度不明				
4. 鼓腸、インフルエンザ様疾患、食欲減退、頭痛、不眠症	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>その他の副作用</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>5%未満</td></tr> </table>	記載場所	その他の副作用	頻度	5%未満
記載場所	その他の副作用				
頻度	5%未満				
5. 抗テデュグルチド抗体発現	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意		
記載場所	使用上の注意				
6. 胆嚢炎、胆管炎、胆石症	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				
7. 慢性膵炎、急性膵炎、膵管狭窄、膵感染、膵疾患	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				
8. うっ血性心不全	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				
9. 脱水、腎機能障害、体液量過剰、うっ血性心不全	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				
10. 大腸ポリープ、大腸癌、胃ポリープ、小腸ポリープ、肝胆道系ポリープ、膵臓ポリープ、胃に増殖性変化、小腸に増殖性変化、肝胆道系に増殖性変化、膵臓に増殖性変化、胃悪性腫瘍、小腸悪性腫瘍、肝胆道系悪性腫瘍、膵臓悪性腫瘍、胃良性腫瘍、小腸良性腫瘍、肝胆道系良性腫瘍、膵臓良性腫瘍、体液量過剰、うっ血性心不全、胃腸の増殖性変化、肝胆道系の増殖性変化、膵臓の増殖性変化、腸ポリープ、抗テデュグルチド抗体発現	<table border="0"> <tr><td>記載場所</td><td>使用上の注意</td></tr> <tr><td>頻度</td><td>頻度不明</td></tr> </table>	記載場所	使用上の注意	頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意				
頻度	頻度不明				

レバスティブ皮下注用0.95mgの相互作用

1. 薬剤名等：経口剤

発現事象	吸収を高める
理由・原因	本剤の薬理作用

投与条件	-
指示	注意

