

商品名 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	オキシブチニン塩酸塩錠2mg錠
英名	Oxybutynin hydrochloride	剤型	錠
薬価	6.10	規格	2mg 1錠
メーカー	陽進堂	毒劇区分	

オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」の効能・効果

(無抑制収縮を伴う過緊張性膀胱状態、神経因性膀胱、不安定膀胱)の(尿意切迫感、尿失禁、頻尿)

オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」の使用制限等

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. 下部尿路閉塞症状、尿閉、排尿困難、閉塞隅角緑内障、重篤な心疾患、麻痺性イレウス、重症筋無力症、高齢者の腸アトニー、衰弱患者の腸アトニー、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 排尿困難の恐れのある前立腺肥大、甲状腺機能亢進症、うっ血性心不全、頻脈性不整脈、不整脈、潰瘍性大腸炎、重篤な肝疾患、重篤な腎疾患、パーキンソン症候群、認知機能障害のある高齢者、認知症のある高齢者、開放隅角緑内障 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 慎重投与 |

オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」の副作用等

- | | | |
|---|------|---------|
| 1. 血小板減少、麻痺性イレウス、著しい便秘、腹部膨満、尿閉 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 眩暈、眠気、頭痛、しびれ、振戦、認知機能障害、抑うつ、頻脈、口渇、下痢、胃腸障害、胃部不快感、嘔気、食欲不振、胸やけ、便秘、腹部膨満感、口内炎、嘔吐、舌炎、嚥下障害、過敏症、発疹、血管浮腫、蕁麻疹、排尿困難、残尿、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、浮腫、倦怠感、口が苦い、発熱、熱感、目のかすみ、眼瞼結膜充血、汗が出なくなる、咽頭部痛、胸痛、皮膚乾燥、嗝声、眼乾燥、潮紅 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 3. 頻脈、心悸亢進、排尿障害、心拍数増加、中毒性巨大結腸、急激に体温上昇 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 頻度 | 頻度不明 |

オキシブチニン塩酸塩錠2mg「YD」の相互作用

1. 薬剤名等：抗コリン剤

発現事象 口渇・便秘・排尿困難・目のかすみ等の副作用が増強

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意

2. 薬剤名等：三環系抗うつ剤

発現事象 口渇・便秘・排尿困難・目のかすみ等の副作用が増強

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意

3. 薬剤名等：フェノチアジン系薬剤

発現事象 口渇・便秘・排尿困難・目のかすみ等の副作用が増強

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意

4. 薬剤名等：モノアミン酸化酵素阻害剤

発現事象 口渇・便秘・排尿困難・目のかすみ等の副作用が増強

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』