

商品名 プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	プロピペリン塩酸塩錠
英名	Propiverine hydrochloride YD	剤型	錠
薬価	25.50	規格	20mg 1錠
メーカー	陽進堂	毒劇区分	

プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」の効能・効果

(神経因性膀胱、不安定膀胱、慢性前立腺炎、慢性膀胱炎、膀胱刺激状態、神経性頻尿)の(尿失禁、頻尿)、過活動膀胱の(尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁)

プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」の使用制限等

1. 腸管閉塞、十二指腸閉塞、幽門閉塞、胃アトニー、腸アトニー、尿閉、閉塞隅角緑内障、重症筋無力症、重篤な心疾患	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 前立腺肥大症、排尿困難、緑内障＜閉塞隅角緑内障を除く＞、不整脈又はその既往、脳血管障害、パーキンソン症状、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症、腎障害又はその既往、肝障害又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

プロピペリン塩酸塩錠20mg「YD」の副作用等

1. 急性緑内障発作、眼圧亢進、嘔気、頭痛、眼痛、視力低下、麻痺性イレウス、著しい便秘、腹部膨満、腎機能障害、BUN上昇、血中クレアチニン上昇、横紋筋融解症、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、皮膚粘膜眼症候群、Stevens－Johnson症候群、発熱、紅斑、そう痒感、眼充血、口内炎、心室性頻拍、房室ブロック、徐脈、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 尿閉、幻覚、せん妄、血小板減少、QT延長、AST上昇、ALT上昇、γ－GTP上昇、肝機能障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 口渇	記載場所	その他の副作用
4. 消化不良、舌炎、尿意消失、意識障害、見当識障害、一過性健忘、パーキンソン症状、すくみ足、小刻み歩行、歩行障害、振戦、ジスキネジア、動悸、徐脈、期外収縮、胸部不快感、BUN上昇、クレアチニン上昇、倦怠感、咽頭部痛、腰痛、嗄声、痰のからみ	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

5. 便秘、腹痛、嘔気、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、排尿困難、残尿、めまい、頭痛、しびれ、眠気、血圧上昇、過敏症、そう痒、発疹、蕁麻疹、眼調節障害、眼球乾燥、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、白血球減少、浮腫、脱力感、味覚異常

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

6. 中毒性巨大結腸、頻脈、交感神経興奮症状が悪化、せん妄、興奮、全身痙攣、歩行障害、言語障害、散瞳、麻痺性イレウス、尿閉、血圧上昇、全身紅潮、肝機能障害、腎腫瘍、肝腫瘍

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」の相互作用

1. 薬剤名等：抗コリン作用を有する薬剤

発現事象 便秘、排尿困難、口渇

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.