

商品名 タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	タムスロシン塩酸塩カプセル
英名	Tamsulosin hydrochloride	剤型	徐放カプセル
薬価	22.90	規格	0.2mg 1カプセル
メーカー	日医工	毒劇区分	

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」の効能・効果

前立腺肥大症の排尿障害

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 起立性低血圧、重篤な肝機能障害、重篤な腎機能障害、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤服用中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」の副作用等

1. 失神、血圧低下、一過性意識喪失、肝機能障害、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 眩暈、ふらふら感、立ちくらみ、頭痛、眠気、いらいら感、しびれ感、血圧低下、起立性低血圧、頻脈、動悸、不整脈、過敏症、そう痒感、発疹、蕁麻疹、多形紅斑、血管浮腫、胃不快感、嘔気、嘔吐、口渇、便秘、胃重感、胃痛、食欲不振、下痢、嚥下障害、鼻閉、浮腫、尿失禁、咽頭灼焼感、全身倦怠感、味覚異常、女性化乳房、持続勃起症、射精障害、術中虹彩緊張低下症候群、霧視、視力障害、ほてり、熱感、灼熱感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 血圧低下、術中虹彩緊張低下症候群、Intraoperative Floppy Iris Syndrome	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」の相互作用

1. 薬剤名等：ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤

発現事象	症候性低血圧	投与条件	-
理由・原因	本剤は α 遮断作用を有するため、併用によりこれらの血管拡張作用による降圧作用を増強	指示	慎重投与

2. 薬剤名等：降圧剤

発現事象	血圧低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

3. 薬剤名等：降圧剤

発現事象	起立性低血圧	投与条件	-
理由・原因	降圧剤服用中の患者は起立時の血圧調節力が低下	指示	注意

