

商品名 ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	ナフトピジル50mg口腔内崩壊錠
英名	Naftopidil OD Pfizer	剤型	錠
薬価	10.40	規格	50mg 1錠
メーカー	マイラン製薬	毒劇区分	

ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」の効能・効果

前立腺肥大症の排尿障害

ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 肝機能障害、重篤な心疾患、重篤な脳血管障害、ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤服用中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 血管障害のある高血圧、脚部及びその他の動脈瘤のある高血圧、腎及びその他の動脈狭窄のある高血圧	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」の副作用等

1. AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、 γ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸、失神、血圧低下、一過性意識喪失	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、そう痒感、蕁麻疹、多形紅斑、眩暈、ふらつき、頭痛、頭重、倦怠感、眠気、耳鳴、しびれ感、振戦、味覚異常、頭がボーッとする、立ちくらみ、低血圧、動悸、ほてり、不整脈、期外収縮、心房細動、頻脈、胃部不快感、下痢、便秘、口渇、嘔気、嘔吐、膨満感、腹痛、AST上昇、GOT上昇、ALT上昇、GPT上昇、LDH上昇、Al-P上昇、血小板数減少、霧視、術中虹彩緊張低下症候群、IFIS、色視症、浮腫、尿失禁、悪寒、眼瞼浮腫、肩こり、鼻閉、勃起障害、女性化乳房、胸痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 急性熱性多発性関節炎、術中虹彩緊張低下症候群、Intraoperative Floppy Iris Syndrome、乳腺腫瘍、血清プロラクチンが上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ナフトピジルOD錠50mg「ファイザー」の相互作用

1. 薬剤名等：ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤

発現事象	症候性低血圧	投与条件	-
理由・原因	これらは血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強	指示	慎重投与

2. 薬剤名等：降圧剤

発現事象	血圧低下	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

3. 薬剤名等：利尿剤

発現事象	降圧作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤及び併用薬の降圧作用が互いに協力的に作用	指示	注意

4. 薬剤名等：降圧剤

発現事象	降圧作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤及び併用薬の降圧作用が互いに協力的に作用	指示	注意

