

商品名 ナフトピジルOD錠25mg「NIG」 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠
英名	Naftopidil OD	剤型	錠
薬価	10.40	規格	25mg 1錠
メーカー	日医工岐阜工場	毒劇区分	

ナフトピジルOD錠25mg「NIG」の効能・効果

前立腺肥大症の排尿障害

ナフトピジルOD錠25mg「NIG」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 重篤な心疾患、重篤な脳血管障害、肝機能障害、血管障害のある高血圧、脚部及びその他の動脈瘤のある高血圧、腎及びその他の動脈狭窄のある高血圧	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ナフトピジルOD錠25mg「NIG」の副作用等

1. AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸、失神、血圧低下、一過性意識喪失	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、多形紅斑、頭がボーッとする、頻脈、血小板数減少、術中虹彩緊張低下症候群、IFIS、色視症、女性化乳房、胸痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 発疹、めまい、ふらつき、頭痛、頭重、立ちくらみ、低血圧、胃部不快感、下痢、AST上昇、ALT上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. そう痒感、蕁麻疹、倦怠感、眠気、耳鳴、しびれ感、振戦、味覚異常、動悸、ほてり、不整脈、期外収縮、心房細動、便秘、口渇、嘔気、嘔吐、膨満感、腹痛、LDH上昇、Al-P上昇、霧視、浮腫、尿失禁、悪寒、眼瞼浮腫、肩こり、鼻閉、勃起障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満

5. 急性熱性多発性関節炎、術中虹彩緊張低下症候群、Intraoperative Floppy Iris Syndrome、乳腺腫瘍、血清プロラクチンが上昇

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ナフトピジルOD錠25mg「NIG」の相互作用

1. 薬剤名等：降圧剤

発現事象 血圧低下

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

2. 薬剤名等：利尿剤

発現事象 降圧作用が増強

理由・原因 本剤及び併用薬の降圧作用が互いに協力的に作用

投与条件 -

指示 注意

3. 薬剤名等：降圧剤

発現事象 降圧作用が増強

理由・原因 本剤及び併用薬の降圧作用が互いに協力的に作用

投与条件 -

指示 注意

4. 薬剤名等：ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤

発現事象 症候性低血圧

理由・原因 これらは血管拡張作用による降圧作用を有するため、併用により降圧作用を増強

投与条件 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』