

商品名 デトルシトールカプセル2mg 医薬品基本情報

薬効	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	一般名	トルテロジン酒石酸塩カプセル
英名	Detrusitol	剤型	カプセル
薬価	58.20	規格	2mg 1カプセル
メーカー	ヴィアトリス製薬	毒劇区分	

デトルシトールカプセル2mgの効能・効果

過活動膀胱の(尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁)

デトルシトールカプセル2mgの使用制限等

1. 認知機能障害で過活動膀胱の自覚症状の把握が困難、認知症で過活動膀胱の自覚症状の把握が困難	記載場所	効能・効果
	注意レベル	禁止
2. 尿閉、慢性尿閉に伴う溢流性尿失禁、眼圧が調節できない閉塞隅角緑内障、重篤な心疾患、麻痺性イレウス、胃アトニー、腸アトニー、重症筋無力症、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
3. 肝障害、腎障害、アゾール系抗真菌薬を併用、チトクロムP450分子種<CYP3A4>阻害薬を併用、マクロライド系抗生物質を併用	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
4. 溢流性尿失禁又はその恐れ・疑い、尿閉又はその恐れ・疑い、排尿困難のある前立腺肥大、胃腸管運動が低下又はその恐れ・疑い、潰瘍性大腸炎、眼圧が調節可能な閉塞隅角緑内障、狭心症、虚血性心疾患、QT延長症候群、クラス1A抗不整脈薬投与中、クラス3抗不整脈薬投与中、甲状腺機能亢進症、認知機能障害、認知症、脳血管障害、パーキンソン症状、腎機能障害、肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

デトルシトールカプセル2mgの副作用等

1. アナフィラキシー、血管浮腫	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 尿閉	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満

3. 口内乾燥、便秘、消化不良、腹痛、頭痛、眼球乾燥	記載場所	その他の副作用
4. 腹部不快感、腹部膨満、幻覚、健忘、一過性記憶喪失、失見当識、心電図QT延長、皮膚そう痒症、潮紅、ほてり、発赤	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 嘔気、鼓腸放屁、下痢、嘔吐、傾眠、めまい、知覚減退、心悸亢進、頻脈、排尿障害、排尿困難、尿失禁、膀胱違和感、皮膚乾燥、発疹、味覚倒錯、疲労、口渇、鼻炎、末梢浮腫、視力異常、霧視	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. QT間隔延長、中毒性巨大結腸、頻脈、交感神経興奮症状が悪化、胎仔致死作用、催奇形性、産仔体重増加抑制、眼調節障害、排尿困難、重篤な中枢性抗コリン作用、幻覚、重度の興奮、痙攣、著しい興奮、呼吸不全、尿閉、散瞳	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 重篤な中枢性抗コリン作用、幻覚、重度の興奮	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 痙攣、著しい興奮	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 呼吸不全	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 頻脈	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
11. 尿閉	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
12. 散瞳	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

デトルシトールカプセル2mgの相互作用

1. 薬剤名等：クラス1A抗不整脈薬投与中

発現事象 QT間隔の更なる延長

投与条件 -

理由・原因 QT間隔の更なる延長

指示 注意

2. 薬剤名等：クラス3抗不整脈薬投与中

発現事象 QT間隔の更なる延長

投与条件 -

理由・原因 QT間隔の更なる延長

指示 注意

3. 薬剤名等：抗コリン作用を有する薬剤

発現事象 便秘、排尿困難、口内乾燥、視力異常

投与条件 -

理由・原因 抗コリン作用が増強

指示 注意

4. 薬剤名等：CYP3A4阻害薬

発現事象 トルテロジン及びDD01の血清中濃度上昇に伴い効果や副作用の増強

投与条件 -

理由・原因 併用薬剤のCYP3A4阻害作用

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』