

商品名 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」 医薬品基本情報

薬効	2634 外用抗生物質製剤	一般名	クリンダマイシンリン酸エステル1%ゲル
英名	Clindamycin phosphate IWAKI	剤型	ゲル
薬価	11.70	規格	1% 1g
メーカー	岩城製薬	毒劇区分	

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」の効能・効果

ざ瘡＜化膿性炎症を伴うもの＞

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」の使用制限等

1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 抗生物質に関連した下痢の既往、抗生物質に関連した大腸炎の既往、アトピー性体質	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」の副作用等

1. 偽膜性大腸炎、血便、重篤な大腸炎、腹痛、頻回の下痢	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. そう痒	記載場所	その他の副作用
3. グラム陰性菌毛嚢炎、脂性肌、過敏症、接触皮膚炎、消化器障害	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 皮膚つっぱり感、皮膚パリパリ感、発赤、発赤悪化、蕁麻疹、刺激感、ヒリヒリ感、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、総ビリルビン上昇、ウロビリノーゲン陽性、白血球増加、血小板増加、総コレステロール低下、尿蛋白、尿糖	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
5. 偽膜性大腸炎、重篤な大腸炎、重症の即時型アレルギー反応	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」の相互作用

1. 薬剤名等： エリスロマイシン

発現事象	本剤の効果があらわれない	投与条件	-
理由・原因	細菌のリボソーム50S Subunitへの親和性が本剤より高い	指示	注意

2. 薬剤名等： 末梢性筋弛緩剤

発現事象	筋弛緩作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤は神経筋遮断作用を有する	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』