

商品名 リンデロン-Vクリーム0.12% 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム
英名	Rinderon-V	剤型	クリーム
薬価	16.90	規格	0.12% 1g
メーカー	シオノギファーマ	毒劇区分	

リンデロン-Vクリーム0.12%の効能・効果

乾癬、毛孔性紅色皰糠疹、結節性紅斑、紅皮症、固定蕁麻疹、掌蹠膿疱症、女子顔面黒皮症、進行性指掌角皮症、蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、ダリエ遠心性環状紅斑、日光皮膚炎、ビダール苔癬、皮膚そう痒症、扁平苔癬、放射線皮膚炎、虫さされ、ジベルバラ色皰糠疹、光沢苔癬、多形滲出性紅斑、紅斑症、湿疹・皮膚炎群、痒疹群、悪性リンパ腫の紅皮症、ケロイド、痔核、中毒疹、天疱瘡群、凍瘡、瘢痕、薬疹、類天疱瘡、慢性円板状エリテマトーデス、悪性円形脱毛症、円形脱毛症、熱傷、ジューリング疱疹状皮膚炎、(中耳根治手術、内耳開窓術、鼓室形成手術)の術創

リンデロン-Vクリーム0.12%の使用制限等

1. ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍くベーチェット病は除く	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎	記載場所	効能・効果
	注意レベル	原則禁止

リンデロン-Vクリーム0.12%の副作用等

1. 眼圧亢進、緑内障、後囊白内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、皮膚刺激感、接触性皮膚炎、発疹、中心性漿液性網脈絡膜症、皮膚感染症、皮膚細菌感染症、伝染性膿痂疹、毛囊炎、せつ、皮膚真菌症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬、皮膚ウイルス感染症、ステロイドざ瘡、白色面皰、ステロイド酒さ、口囲皮膚炎、口囲紅斑、顔面全体紅斑、丘疹、毛細血管拡張、痂皮、鱗屑、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、下垂体・副腎皮質系機能抑制、急性副腎皮質機能不全	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 魚鱗癬様皮膚変化、紫斑、多毛、皮膚色素脱失	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満


4. 全身投与した場合と同様な症状、発育障害

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.