

商品名 トプシム軟膏0.05% 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	フルオシノニド軟膏
英名	Topsym	剤型	軟膏・硬膏
薬価	13.10	規格	0.05% 1g
メーカー	田辺三菱製薬	毒劇区分	(劇)

トプシム軟膏0.05%の効能・効果

女子顔面黒皮症、進行性指掌角皮症、日光皮膚炎、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、湿疹・皮膚炎群、ストロフルス、じん麻疹様苔癬、固定じん麻疹、痒疹群、乾癬、掌蹠膿疱症、悪性円形脱毛症、円形脱毛症、尋常性白斑

トプシム軟膏0.05%の使用制限等

1. ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍くベーチェット病は除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎	記載場所	効能・効果
	注意レベル	原則禁止

トプシム軟膏0.05%の副作用等

1. 眼圧亢進、緑内障、後囊白内障	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 皮膚感染症、皮膚真菌性感染症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬、皮膚細菌性感染症、伝染性膿痂疹、毛嚢炎、ざ瘡疹、酒さ様皮膚炎、口囲皮膚炎、口囲紅斑、顔面全体紅斑、丘疹、毛細血管拡張、痂皮、鱗屑、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、過敏症、接触皮膚炎、下垂体・副腎皮質系機能抑制	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 魚鱗癬様皮膚変化、紫斑、多毛、皮膚色素脱失、皮膚刺激感、皮膚乾燥、紅斑、丘疹、腫脹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 全身的投与した場合と同様な症状、催奇形作用、外形異常、発育障害	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.