

## 商品名 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 医薬品基本情報

薬効	2646 副腎皮質ホルモン製剤	一般名	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏
英名	Mometasone furoate IWAKI	剤型	軟膏・硬膏
薬価	20.10	規格	0.1% 1g
メーカー	岩城製薬	毒劇区分	(劇)

### モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」の効能・効果

円形脱毛症、乾癬、ケロイド、紅皮症、固定蕁麻疹、掌蹠膿疱症、進行性指掌角皮症、蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、中毒疹、天疱瘡群、肥厚性癬痕、虫さされ、薬疹、類天疱瘡、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、シャンバーグ病、多形滲出性紅斑、ジベル薔薇色皰糠疹、湿疹・皮膚炎群、痒疹群

### モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」の使用制限等

- ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍<ペーチェット病は除く>
- 皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

記載場所	効能・効果
注意レベル	原則禁止

### モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」の副作用等

- 眼圧亢進、緑内障、後囊白内障
- 過敏症、紅斑、皮膚感染症、皮膚細菌感染症、伝染性膿痂疹、毛囊炎、せつ、皮膚ウイルス感染症、酒さ様皮膚炎、口囲皮膚炎、ほほに潮紅、口囲潮紅、丘疹、膿疱、多毛、下垂体・副腎皮質系機能抑制、急性副腎皮質機能不全
- 皮膚刺激感、接触皮膚炎、皮膚真菌症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬、ざ瘡様発疹、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、ステロイド潮紅、毛細血管拡張、紫斑、皮膚色素脱失

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

4. 皮膚そう痒、皮膚乾燥

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

5. 全身投与した場合と同様な症状、催奇形作用、発育障害

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.