

商品名 ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 医薬品基本情報

薬効	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	一般名	ケトプロフェン（60mg）20cm×14cm貼付剤
英名	Ketoprofen Rakool	剤型	貼付剤
薬価	17.10	規格	20cm×14cm 1枚
メーカー	三友薬品	毒劇区分	

ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」の効能・効果

(肩関節周囲炎、腱炎、腱周囲炎、腱鞘炎、テニス肘、変形性関節症、上腕骨上顆炎、筋肉痛、外傷後の腫脹、外傷後の疼痛)の(消炎、鎮痛)

ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、アスピリン喘息又はその既往、非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作又はその既往、スプロフェンに対して過敏症の既往、チアプロフェン酸に対して過敏症の既往、フェノフィブラートに対して過敏症の既往、オクトクリレンを含有する製品に対して過敏症の既往、オキシベンゾンを含有する製品に対して過敏症の既往、光線過敏症の既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 皮膚感染症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 気管支喘息<アスピリン喘息又はその既往歴を除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」の副作用等

1. 重篤な接触皮膚炎、光線過敏症、重度全身性発疹	記載場所	効能・効果
	頻度	頻度不明
2. ショック、皮膚腫脹、皮膚浮腫、皮膚水疱、皮膚びらん、重度皮膚炎症状、皮膚色素沈着、皮膚色素脱失、全身に皮膚炎症状が拡大し重篤化、光線過敏症、強い皮膚そう痒、紅斑、発疹、皮膚刺激感	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 接触皮膚炎、発疹、発赤、皮膚そう痒感、皮膚刺激感、紅斑	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
4. アナフィラキシー、蕁麻疹、呼吸困難、顔面浮腫、アスピリン喘息、乾性ラ音、喘鳴、呼吸困難感、喘息発作	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
5. 過敏症、蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 局所発疹、発赤、皮膚腫脹、皮膚そう痒感、皮膚刺激感、皮膚水疱、皮膚びらん、皮膚色素沈着	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 皮下出血	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
8. 接触皮膚炎、光線過敏症、重度全身性発疹、異常、感染症を不顕性化、胎児動脈管収縮、羊水過少症、腎機能障害、尿量減少	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

