

商品名 ロキソニンゲル1% 医薬品基本情報

薬効	2649 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	一般名	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル
英名	Loxonin	剤型	ゲル
薬価	2.60	規格	1% 1g
メーカー	第一三共	毒劇区分	

ロキソニンゲル1%の効能・効果

(変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹、外傷後の疼痛)の(消炎、鎮痛)

ロキソニンゲル1%の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、アスピリン喘息又はその既往、非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作又はその既往	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 皮膚感染症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	慎重投与
3. 気管支喘息<アスピリン喘息又はその既往歴を除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ロキソニンゲル1%の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 皮膚刺激、皮膚色素沈着、皮膚水疱、皮膚腫脹、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 皮膚そう痒、紅斑、接触性皮膚炎、皮疹、胃不快感、上腹部痛、下痢、軟便、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 感染症を不顕性化、胎児動脈管収縮、腎機能障害、尿量減少、羊水過少症、使用部位皮膚症状、全身的投与と同様の副作用

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.