

商品名 タカルシトール軟膏2 μ g/g「NIG」 医薬品基本情報

薬効	2691 外用ビタミン製剤	一般名	タカルシトール0.0002%軟膏
英名	Tacalcitol	剤型	軟膏・硬膏
薬価	36.60	規格	0.0002% 1g
メーカー	日医工岐阜工場	毒劇区分	(劇)

タカルシトール軟膏2 μ g/g「NIG」の効能・効果

乾癬、毛孔性紅色皰糠疹、掌蹠角化症、掌蹠膿疱症、魚鱗癬

タカルシトール軟膏2 μ g/g「NIG」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

タカルシトール軟膏2 μ g/g「NIG」の副作用等

1. 頭痛、皮膚ヒリヒリ感、発赤、接触皮膚炎、皮膚そう痒、皮膚刺激感、AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、ALP上昇、白血球増多、血清リン低下、尿たん白陽性
2. 皮膚腫脹
3. 血清カルシウム値上昇、高カルシウム血症、腎機能低下

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満
記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

タカルシトール軟膏2 μ g/g「NIG」の相互作用

1. 薬剤名等：ビタミンD

発現事象	血清カルシウム値が上昇
理由・原因	相加作用

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：ビタミンD誘導体

発現事象 血清カルシウム値が上昇

投与条件 -

理由・原因 相加作用

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.