

商品名 オクソラレンローション1% 医薬品基本情報

薬効	2699 他に分類されない外用薬	一般名	メトキサレン液
英名	Oxsoralen	剤型	液
薬価	35.50	規格	1% 1mL
メーカー	大正製薬	毒劇区分	

オクソラレンローション1%の効能・効果

尋常性白斑

オクソラレンローション1%の使用制限等

1. 皮膚癌又はその既往、光線過敏症、紅斑性狼瘡、色素性乾皮症、多形性日光皮膚炎、ポルフィリン症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 光線過敏症の既往、薬剤性光線過敏症の既往、乾癬	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

オクソラレンローション1%の副作用等

1. 皮膚水疱、皮膚炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 皮膚腫脹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 皮膚そう痒、紅斑、皮膚熱感、痂皮	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 皮膚癌	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

オクソラレンローション1%の相互作用

1. 薬剤名等：光線過敏症を起こすことが知られている薬剤

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの薬剤との併用により光感受性が増強	指示	注意

2. 薬剤名等：フロクマリンを含有する食物

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

3. 薬剤名等：セロリ

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

4. 薬剤名等：ライム

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

5. 薬剤名等：ニンジン

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

6. 薬剤名等：パセリ

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

7. 薬剤名等：イチジク

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

8. 薬剤名等：アメリカボウフウ

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

9. 薬剤名等：カラシ等

発現事象	光線過敏症	投与条件	-
理由・原因	本剤は光感受性を高める作用があるので、これらの食品の摂取により光感受性が増強	指示	注意

10. 薬剤名等：CYP2A6によって代謝される薬剤

発現事象	作用を増強	投与条件	-
理由・原因	本剤は、CYP2A6を阻害することにより、併用薬剤の血中濃度を上昇	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』