

商品名 ドボベツト軟膏 医薬品基本情報

薬効	2699 他に分類されない外用薬	一般名	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏
英名	Dovobet	剤型	軟膏・硬膏
薬価	154.10	規格	1g
メーカー	レオ ファーマ	毒劇区分	(劇)

ドボベツト軟膏の効能・効果

尋常性乾癬

ドボベツト軟膏の使用制限等

- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ウイルス皮膚感染症、疥癬、けじらみ、動物性皮膚疾患、スピロヘータ皮膚感染症、細菌皮膚感染症、真菌皮膚感染症、第2度深在性以上の熱傷、第2度深在性以上の凍傷、潰瘍<ペーチェット病は除く>
- 皮膚バリア機能が低下し本剤の経皮吸収が増加又はその恐れ・疑い、皮疹が広範囲、高カルシウム血症又はその恐れ・疑い、腎機能障害

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

ドボベツト軟膏の副作用等

- 高カルシウム血症、倦怠感、脱力感、食欲不振、嘔吐、腹痛、筋力低下
- 血清カルシウム上昇、急性腎障害、血清クレアチニン上昇、BUN上昇

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

3. 過敏症、紅斑、発赤、皮膚そう痒、発疹、皮膚灼熱感、皮膚刺激感、皮膚炎、魚鱗癬様皮膚変化、皮膚乾燥、皮膚びらん、接触性皮膚炎、落屑、皮疹、皮膚腫脹、皮膚感染症、皮膚細菌感染症、伝染性膿痂疹、せつ、皮膚真菌症、皮膚カンジダ症、皮膚白癬、皮膚ウイルス感染症、皮膚色素沈着、膿疱性乾癬、ざ瘡様発疹、酒さ様皮膚炎、ステロイド皮膚、皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑、多毛、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、ALP上昇、総ビリルビン上昇、BUN上昇、血清クレアチニン上昇、尿中クレアチニン上昇、白血球減少、白血球増多、ヘモグロビン減少、リンパ球減少、単球増多、好中球減少、下垂体・副腎皮質系機能抑制、急性副腎皮質機能不全、尿中カルシウム上昇、血清リン上昇、血清リン低下、尿中リン低下、血清 $1\alpha, 25$ [OH] $2D_3$ 上昇、血清 $1\alpha, 25$ [OH] $2D_3$ 低下、乾癬リバウンド

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

4. 皮膚疼痛、毛包炎、膿疱性発疹、皮膚色素脱失、肝機能異常、白血球増加症、貧血、単純ヘルペス、末梢性浮腫、挫傷、尿中ブドウ糖陽性、血清カルシウム上昇

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

5. 血清カルシウム値上昇、高カルシウム血症、腎機能低下

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

6. 高カルシウム血症、皮膚萎縮、ステロイド潮紅、副腎皮質ホルモン剤を全身投与した場合と同様な症状、皮膚刺激、全身性の副作用、血清カルシウム値上昇、催奇形作用、倦怠感、脱力感、食欲不振、嘔気、嘔吐、腹部膨満感、腹痛、頭痛、めまい、筋肉痛、筋力低下、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、皮膚腫瘍誘発に必要な光線照射時間の有意な短縮

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ドボベツト軟膏の相互作用

1. 薬剤名等：副腎皮質ホルモン剤

発現事象 -

投与条件 同一病変

理由・原因 副腎皮質ホルモンを含有

指示 禁止

2. 薬剤名等：ビタミンD

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 相加作用

指示 注意

3. 薬剤名等：ビタミンD誘導体

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 相加作用

指示 注意

4. 薬剤名等：シクロスポリン

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 本剤による血清カルシウム値の上昇が、シクロスポリンによる腎機能の低下によりあらわれやすくなる

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.