

商品名 エピデュオゲル 医薬品基本情報

薬効	2699 他に分類されない外用薬	一般名	アダパレン・過酸化ベンゾイルゲル
英名	Epiduo	剤型	ゲル
薬価	98.90	規格	1g
メーカー	マルホ	毒劇区分	(劇)

エピデュオゲルの効能・効果

尋常性ざ瘡

エピデュオゲルの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 嚢腫、結節	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意

エピデュオゲルの副作用等

1. 皮膚刺激	記載場所	その他の副作用
2. 顔面腫脹、皮膚水疱、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不快感、皮膚刺激感、湿疹、ざ瘡、接触皮膚炎、皮脂欠乏症、皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹、発疹、そう痒性皮疹、脂漏性皮膚炎、皮膚浮腫、蕁麻疹、乾皮症、間擦疹、脂腺機能亢進、顔面浮腫、丘疹、皮膚炎症、紅斑性皮疹、皮膚反応、アレルギー性接触皮膚炎、汗疹、眼瞼刺激、眼瞼紅斑、眼瞼そう痒症、眼瞼腫脹、咽喉絞扼感、単純ヘルペス、血中ビリルビン増加、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、血中コレステロール増加、腫脹、ピリピリ感、灼熱感、口角炎、白血球数減少、白血球数増加、血小板数増加、違和感、ほてり、血中コレステロール減少、血中尿素減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 皮膚疼痛、アレルギー性皮膚炎、紅斑、皮膚そう痒症、日光皮膚炎、皮膚びらん、皮膚剥脱、眼瞼炎、眼瞼浮腫、サンバーン	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 過敏症、重度皮膚刺激感、皮膚剥脱、紅斑、刺激感、腫脹、過剰肋骨、催奇形作用	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

エピデュオゲルの相互作用

1. 薬剤名等：刺激性のある外用剤

発現事象	皮膚刺激感が増す	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版『DIR』