

商品名 マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」 医薬品基本情報

薬効	3112 合成ビタミンD製剤	一般名	マキサカルシトールキット
英名	Maxacalcitol ISEI	剤型	キット類
薬価	858.00	規格	5 μ g 1mL 1筒
メーカー	コーアイセイ	毒劇区分	(劇)

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」の効能・効果

維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」の使用制限等

1. 高カルシウム血症

記載場所 使用上の注意

注意レベル **注意**

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」の副作用等

1. 高カルシウム血症、そう痒感、いらいら感

記載場所 重大な副作用

2. 皮膚そう痒症、発疹、いらいら感、不眠症、頭痛、AST上昇、代謝異常、CK上昇、血中リン増加、血中ミオグロビン上昇、LDH上昇、Al-P上昇、高血圧、白血球分画異常、リンパ球異常、好酸球異常、四肢不快感、倦怠感

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

3. 脱毛症、不穏、興奮、焦躁感、胃部不快感、腹部不快感、食欲不振、ALT上昇、総蛋白減少、血中尿酸増加、血中アルミニウム上昇、胸部X線異常、白血球減少

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

4. 高度高リン血症

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

5. 血清カルシウム値が 11.5mg/dL ($<5.75\text{mEq/L}$) を超えた、血清カルシウム値上昇、出生仔体重増加抑制、心電図異常、左室肥大、1度AV Block、T波異常、心室性期外収縮、心房細動、良性褐色細胞腫

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」の相互作用

1. 薬剤名等：アルファカルシドール

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 両剤ともに血清カルシウム値を上昇

指示 注意

2. 薬剤名等：カルシトリオール

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 両剤ともに血清カルシウム値を上昇

指示 注意

3. 薬剤名等：PTH製剤

発現事象 高カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 相加作用

指示 注意

4. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象 不整脈

投与条件 -

理由・原因 本剤により高カルシウム血症が発症した場合、ジギタリス製剤の作用が増強

指示 注意

