

商品名 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 医薬品基本情報

薬効	3211 乳酸カルシウム製剤	一般名	乳酸カルシウム水和物
英名	Calcium lactate hydrate KENEI	剤型	末
薬価	38.40	規格	10g
メーカー	健栄製薬	毒劇区分	

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末の効能・効果

低カルシウム血症のテタニーの改善、(産婦の骨軟化症、妊婦の骨軟化症)のカルシウム補給、発育期のカルシウム補給

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末の使用制限等

1. 高カルシウム血症、腎結石、重篤な腎不全	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 高カルシウム血症を起こし易い体質	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末の副作用等

1. 便秘、高カルシウム血症、結石症	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
2. 血中カルシウム高値、尿中カルシウム高値	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末の相互作用

1. 薬剤名等：ジギタリス製剤	発現事象	中毒<不整脈・ショック>	投与条件	-
	理由・原因	ジギタリス製剤の作用を増強	指示	注意
2. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質				

発現事象	作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	カルシウムイオンはキレート化によりテトラサイクリン系抗生物質の吸収を阻害	指示	注意

3. 薬剤名等：ニューキノロン系抗菌剤

発現事象	作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	カルシウムイオンはキレート化によりニューキノロン系抗菌剤の吸収を阻害し、血中濃度を低下	指示	注意

4. 薬剤名等：活性型ビタミンD製剤

発現事象	高カルシウム血症	投与条件	-
理由・原因	腸管でのカルシウムの吸収が促進	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』