

商品名 ヨウ化カリウム「ホエイ」 医薬品基本情報

薬効	3221 ヨウ素化合物製剤	一般名	ヨウ化カリウム
英名	Potassium iodide	剤型	末
薬価	7.70	規格	1g
メーカー	ヴィアトリス・ヘルスケア	毒劇区分	(劇)

ヨウ化カリウム「ホエイ」の効能・効果

ヨード欠乏による甲状腺腫、甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫、(喘息、慢性気管支炎)の喀痰喀出困難、第三期梅毒、放射性ヨウ素の甲状腺内部被曝の(予防、低減)

ヨウ化カリウム「ホエイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ヨウ素に対し過敏症の既往、甲状腺内部被曝の予防・低減以外でエプレレノン投与中<高血圧症>、放射性ヨウ素による甲状腺内部被曝の予防・低減以外でエサキセレノン投与中、放射性ヨウ素による甲状腺内部被曝の予防・低減以外で肺結核	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、先天性筋強直症、高カリウム血症、低補体血症性蕁麻疹様血管炎又はその既往、ヨード造影剤過敏症の既往、ジューリング疱疹状皮膚炎又はその既往、放射性ヨウ素による甲状腺内部被曝の予防・低減で肺結核、腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ヨウ化カリウム「ホエイ」の副作用等

1. ヨウ素中毒、結膜炎、眼瞼浮腫、鼻炎、喉頭炎、気管支炎、声門浮腫、喘息発作、前額痛、流涎、唾液腺腫脹、耳下腺炎、胃炎、発疹、面疱、せつ、蕁麻疹、水疱、微熱、甲状腺腫、粘液水腫、ヨウ素悪液質、皮膚粗荒、体重減少、全身衰弱、心悸亢進、抑うつ、不眠、神経過敏、性欲減退、乳房腫大、乳房疼痛、骨盤痛	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、悪心、嘔吐、胃痛、下痢、口腔灼熱感、咽喉灼熱感、金属味覚、歯痛、歯肉痛、血便、消化管出血、甲状腺機能低下症、頭痛、息切れ、かぜ症状、不規則性心拍、皮疹、発熱、首腫脹、咽喉腫脹	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 甲状腺機能低下、知的発達に影響	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

4. ヨウ素誘発甲状腺腫、過敏症状、甲状腺腫、甲状腺機能異常、皮疹、甲状腺機能抑制

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ヨウ化カリウム「ホエイ」の相互作用

1. 薬剤名等：エプレレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減以外
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	禁止

2. 薬剤名等：エサキセレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減以外
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	禁止

3. 薬剤名等：カリウム含有製剤

発現事象	高カリウム血症	投与条件	-
理由・原因	相加的に作用	指示	慎重投与

4. 薬剤名等：カリウム保持性利尿剤

発現事象	高カリウム血症	投与条件	-
理由・原因	相加的に作用	指示	慎重投与

5. 薬剤名等：リチウム製剤

発現事象	甲状腺機能低下作用・甲状腺腫発症作用を増大	投与条件	-
理由・原因	両剤とも甲状腺機能低下作用があるため併用により相加的な甲状腺機能低下作用があらわれる	指示	慎重投与

6. 薬剤名等：¹³¹I療法

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

7. 薬剤名等：エプレレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	-
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

8. 薬剤名等：フィネレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	-
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

9. 薬剤名等：抗甲状腺薬

発現事象	甲状腺機能低下と甲状腺腫生成作用を増強	投与条件	-
理由・原因	両剤とも甲状腺機能低下作用があるため併用により相加的な甲状腺機能低下作用があらわれる	指示	注意

10. 薬剤名等：ACE阻害剤

発現事象	高カリウム血症	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤はレニン・アンジオテンシン系に作用し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少	指示	注意

11. 薬剤名等：アンジオテンシン2受容体拮抗剤

発現事象	高カリウム血症	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤はレニン・アンジオテンシン系に作用し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少	指示	注意

12. 薬剤名等：アリスキレンフマル酸塩

発現事象	高カリウム血症	投与条件	-
理由・原因	これらの薬剤はレニン・アンジオテンシン系に作用し、アルドステロンの分泌を低下させるため、カリウム排泄を減少	指示	注意

13. 薬剤名等：エプレレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

14. 薬剤名等：エサキセレノン

発現事象	血清カリウム値が上昇	投与条件	放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減
理由・原因	カリウム貯留作用が増強	指示	注意

ヨウ化カリウム「ホエイ」の配合変化

1. 薬剤名等：酸類

発現事象 ヨウ素を析出

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

2. 薬剤名等：酸化剤

発現事象 ヨウ素を析出

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

3. 薬剤名等：水道水中にある遊離塩素

発現事象 ヨウ素を析出

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』