

商品名 リハビックス-K1号輸液 医薬品基本情報

薬効	3239 その他の糖類剤	一般名	高カロリー輸液用基本液（7-1）
英名	Rehabix	剤型	注射液
薬価	1093.00	規格	500mL 1瓶又は1袋
メーカー	エイワイファーマ	毒劇区分	

リハビックス-K1号輸液の効能・効果

(経口栄養補給が不能又は不十分、経腸管栄養補給が不能又は不十分)の経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の(カロリー補給、水分補給、電解質補給)

リハビックス-K1号輸液の使用制限等

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. 高乳酸血症、アジソン病、高カリウム血症、高リン血症、副甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下症、高マグネシウム血症、高カルシウム血症、アミノ酸代謝異常、遺伝性果糖不耐症、高窒素血症<透析又は血液ろ過実施中を除く>、重篤な腎障害<透析又は血液ろ過実施中を除く>、乏尿<透析又は血液ろ過実施中を除く>、肝性昏睡又はその恐れ・疑い | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 透析又は血液ろ過実施中の高窒素血症、透析又は血液ろ過実施中の重篤な腎障害、透析又は血液ろ過実施中の乏尿、高度アシドーシス、糖尿病、膵炎、膵硬化症、膵腫瘍、膵障害、心不全、重症熱傷、脱水症、閉塞性尿路疾患により尿量が減少、尿崩症、菌血症、腎障害<重篤な腎障害・高窒素血症又は乏尿を除く> | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

リハビックス-K1号輸液の副作用等

- | | | |
|-------------------------------|------|---------|
| 1. 重篤なアシドーシス | 記載場所 | 用法・用量 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 重篤なアシドーシス、過度の高血糖、高浸透圧利尿、口渇 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 3. AST上昇、ALT上昇 | 記載場所 | その他の副作用 |
| 4. Al-P上昇、高カリウム血症、高ナトリウム血症 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |

5. 重篤なアシドーシス、ビタミンB1欠乏症、アシドーシス、低血糖、肝不全、腎不全、高血糖、尿糖、耐糖能異常

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

リハビックス-K1号輸液の相互作用

1. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	中毒＜不整脈等＞
------	----------

理由・原因	カルシウムがジギタリス製剤の作用を増強
-------	---------------------

投与条件	-
------	---

指示	注意
----	----

リハビックス-K1号輸液の配合変化

1. 薬剤名等：脂肪乳剤

発現事象	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

投与条件	-
------	---

指示	禁止
----	----

