

商品名 エレンタール配合内用剤 医薬品基本情報

薬効	3259 その他のたん白アミノ酸製剤	一般名	経腸成分栄養剤（1-1）散
英名	Elental	剤型	散
薬価	58.60	規格	10g
メーカー	E A ファーマ	毒劇区分	

エレンタール配合内用剤の効能・効果

未消化態蛋白を含む経管栄養剤の適応困難時の術後栄養管理、腸内の清浄化を要する疾患の栄養管理、術直後の栄養管理、(消化管瘻、短腸症候群、縫合不全、消化管異常病態下)の栄養管理、(潰瘍性大腸炎、クローン氏病、消化不全症候群、膵疾患、蛋白漏出性腸症、消化管特殊疾患時)の栄養管理、(広範囲熱傷、高カロリー輸液の適応が困難)の栄養管理

エレンタール配合内用剤の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、ステロイド大量投与の患者で糖代謝異常又はその恐れ・疑い、重症糖尿病、アミノ酸代謝異常	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 長期間単独投与、投与初期	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

エレンタール配合内用剤の副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、意識障害、呼吸困難、チアノーゼ、悪心、胸内苦悶、顔面潮紅、そう痒感、発汗	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ダンピング症候群様低血糖、倦怠感、発汗、冷汗、顔面蒼白、痙攣、意識低下	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 下痢	記載場所	その他の副作用
4. 腹部膨満感、悪心、嘔吐、腹痛、血中AST上昇、血中ALT上昇、Al-P上昇、血中尿素窒素上昇、血糖値上昇、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. LDH上昇、 γ -GTP上昇、中性脂肪上昇、発汗、発疹

記載場所	その他の副作用
------	---------

頻度	0.1%未満
----	--------

6. 高血糖、高アミノ酸血症、脂肪酸欠乏、電解質過多、セレン欠乏症、心機能低下、爪白色変化、筋力低下、ダンピング症候群様低血糖、頭蓋神経堤などを中心とする奇形、下痢

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.