

商品名 ツインパル輸液 医薬品基本情報

薬効	3259 その他のたん白アミノ酸製剤	一般名	アミノ酸・糖・電解質（2-3）キット
英名	Twinpal	剤型	キット類
薬価	568.00	規格	1L 1キット
メーカー	エイワイファーマ	毒劇区分	

ツインパル輸液の効能・効果

経口摂取不十分の(軽度の低栄養状態、軽度の低蛋白血症)の(アミノ酸補給、水分補給、電解質補給)、手術前後の(アミノ酸補給、水分補給、電解質補給)

ツインパル輸液の使用制限等

1. アジソン病、高カリウム血症、高リン血症、副甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下症、高マグネシウム血症、高カルシウム血症、アミノ酸代謝異常症、高度アシドーシス、高乳酸血症、うっ血性心不全、閉塞性尿路疾患により尿量が減少、高窒素血症<透析又は血液ろ過実施中を除く>、重篤な腎障害<透析又は血液ろ過実施中を除く>、乏尿<透析又は血液ろ過実施中を除く>、肝性昏睡又はその恐れ・疑い	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 透析又は血液ろ過実施中の高窒素血症、透析又は血液ろ過実施中の重篤な腎障害、透析又は血液ろ過実施中の乏尿、アシドーシス、糖尿病、循環器系機能障害、心臓機能障害、腎障害<重篤な腎障害・高窒素血症又は乏尿を除く>、肝障害<肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれを除く>	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ツインパル輸液の副作用等

1. アナフィラキシー	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 過敏症、発疹、悪心、嘔吐、胸部不快感、動悸、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、総ビリルビン上昇、アシドーシス、脳浮腫、肺水腫、末梢浮腫、高カリウム血症、水中毒、血管痛、静脈炎、悪寒、発熱、熱感、頭痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明


3. アナフィラキシー、血管痛、皮膚壊死、潰瘍、発赤、浸潤、腫脹

記載場所

使用上の注意

頻度

頻度不明



Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.