

## 商品名 フルカリック1号輸液 医薬品基本情報

薬効	3259 その他のたん白アミノ酸製剤	一般名	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（1-1）キット
英名	Fulcaliq 1	剤型	キット類
薬価	1405.00	規格	1,354.5mL 1キット
メーカー	テルモ	毒劇区分	

### フルカリック1号輸液の効能・効果

(経口栄養補給が不能又は不十分、経腸管栄養補給が不能又は不十分)の経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の(アミノ酸補給、カロリー補給、水分補給、電解質補給、ビタミン補給)

### フルカリック1号輸液の使用制限等

- 重篤な肝障害、特殊な輸液組成を必要とする疾患、重篤な腎障害<透析又は血液ろ過実施中を除く>
- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、高乳酸血症、高ナトリウム血症、高クロール血症、アジソン病、高カリウム血症、高リン血症、副甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下症、高マグネシウム血症、高カルシウム血症、アミノ酸代謝異常、血友病、高窒素血症<透析又は血液ろ過実施中を除く>、重篤な腎障害<透析又は血液ろ過実施中を除く>、乏尿<透析又は血液ろ過実施中を除く>、肝性昏睡又はその恐れ・疑い
- 透析又は血液ろ過実施中の高窒素血症、透析又は血液ろ過実施中の重篤な腎障害、透析又は血液ろ過実施中の乏尿、ワルファリン使用中、高度アシドーシス、糖尿病、膵炎、膵硬化症、膵腫瘍、膵障害、心不全、重症熱傷、脱水症、閉塞性尿路疾患により尿量が減少、尿崩症、菌血症、遺伝性果糖不耐症、アレルギーの家族歴、気管支喘息の家族歴、蕁麻疹の家族歴、発疹の家族歴、アレルギーを起こし易い体質、気管支喘息を起こし易い体質、蕁麻疹を起こし易い体質、発疹を起こし易い体質、腎障害<重篤な腎障害・高窒素血症又は乏尿を除く>

記載場所 効能・効果

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

### フルカリック1号輸液の副作用等

- 重篤なアシドーシス、ショック、アナフィラキシー、血圧低下、意識障害、呼吸困難、チアノーゼ、悪心、胸内苦悶、顔面潮紅、そう痒感、発汗、過度の高血糖、高浸透圧利尿、口渇

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

2. 過敏症、蕁麻疹、代謝異常、高尿酸血症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、高ナトリウム血症、尿糖、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、食欲不振、胸部不快感、動悸、腎機能障害、脳浮腫、肺水腫、末梢浮腫、水中毒、高アンモニア血症、顔面潮紅、悪寒、熱感、頭痛、血管痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 発疹、高カリウム血症、肝機能異常	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. ビタミンB1欠乏症、重篤なアシドーシス、アシドーシス、高血糖、尿糖、低血糖、耐糖能異常、肝不全、腎不全、頭蓋神経堤などを中心とする奇形、ビタミンD過剰	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## フルカリック1号輸液の相互作用

1. 薬剤名等：ジギタリス製剤		投与条件	-
発現事象	中毒<不整脈等>	指示	注意
理由・原因	カルシウムがジギタリス製剤の作用を増強		
2. 薬剤名等：レボドパ		投与条件	-
発現事象	作用を減弱	指示	注意
理由・原因	ピリドキシン塩酸塩は、レボドパの脱炭酸酵素の補酵素であり、併用によりレボドパの末梢での脱炭酸化を促進し、レボドパの脳内作用部位への到達量を減少		
3. 薬剤名等：ワルファリン		投与条件	-
発現事象	作用を減弱	指示	注意
理由・原因	フィトナジオン（ビタミンK1）がワルファリンの作用に拮抗		

## フルカリック1号輸液の配合変化

1. 薬剤名等：脂肪乳剤		投与条件	-
発現事象	-	指示	禁止
理由・原因	-		



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

