

## 商品名 シロスタゾールOD錠100mg「JG」 医薬品基本情報

|      |                      |      |                    |
|------|----------------------|------|--------------------|
| 薬効   | 3399 他に分類されない血液・体液用薬 | 一般名  | シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠 |
| 英名   | Cilostazol OD JG     | 剤型   | 錠                  |
| 薬価   | 12.60                | 規格   | 100mg 1錠           |
| メーカー | ダイト                  | 毒劇区分 |                    |

## シロスタゾールOD錠100mg「JG」の効能・効果

慢性動脈閉塞症の(疼痛、冷感、虚血性諸症状、潰瘍)の改善、脳梗塞＜心原性脳塞栓症を除く＞発症後の再発抑制

## シロスタゾールOD錠100mg「JG」の使用制限等

|                                                                          |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. 咯血、硝子体出血、血友病、出血、消化管出血、頭蓋内出血、尿路出血、毛細血管脆弱症、うっ血性心不全、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴   | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                                                          | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 高血圧が持続する脳梗塞                                                           | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                                                          | 注意レベル | 慎重投与   |
| 3. 冠動脈狭窄、月経期間中、出血傾向、出血傾向素因、耐糖能異常、糖尿病、悪性高血圧、持続して血圧が上昇している高血圧、腎機能障害、重篤な肝障害 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|                                                                          | 注意レベル | 注意     |

## シロスタゾールOD錠100mg「JG」の副作用等

|                                                                                                               |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. 心筋梗塞、狭心症、心室頻拍、肺出血、鼻出血、脳出血、頭蓋内出血、頭痛、悪心、嘔吐、意識障害、片麻痺、血小板減少、汎血球減少、無顆粒球症、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多、間質性肺炎、黄疸、急性腎障害 | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                                                                               | 頻度   | 頻度不明    |
| 2. 消化管出血、出血、胃潰瘍、十二指腸潰瘍                                                                                        | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                                                                               | 頻度   | 5%未満    |
| 3. うっ血性心不全、眼底出血、肝機能障害、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇                                                                | 記載場所 | 重大な副作用  |
|                                                                                                               | 頻度   | 0.1%未満  |
| 4. 頭痛、頭重感                                                                                                     | 記載場所 | その他の副作用 |

|                                                                                                                                          |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 5. 過敏症、光線過敏症、紅斑、血圧低下、失神、一過性意識消失、口渇、貧血、白血球減少、好酸球増多、BUN上昇、クレアチニン上昇、排尿障害、結膜炎、筋痛                                                             | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                                                                          | 頻度   | 頻度不明    |
| 6. 発疹、皮疹、そう痒感、動悸、頻脈、ほてり、心房細動、上室性頻拍、上室性期外収縮、心室性期外収縮、不整脈、眠気、めまい、不眠、しびれ感、腹痛、悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、胸やけ、腹部膨満感、味覚異常、出血傾向、皮下出血、尿酸値上昇、頻尿、浮腫、胸痛、耳鳴、倦怠感、発熱 | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                                                                          | 頻度   | 5%未満    |
| 7. 蕁麻疹、血圧上昇、振戦、肩こり、血尿、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇、発汗、疼痛、脱力感、血糖上昇、脱毛                                                                         | 記載場所 | その他の副作用 |
|                                                                                                                                          | 頻度   | 0.1%未満  |
| 8. 脈拍数増加、狭心症、過度の脈拍数増加、生存期間短縮、異常胎仔増加、出生仔低体重、死亡仔増加、糖尿病、糖尿病悪化、左心室心内膜肥厚、冠状動脈病変、左心室心内膜変化、右心房心外膜変化、冠状動脈変化、左心室心内膜出血性変化、心臓毒性                     | 記載場所 | 使用上の注意  |
|                                                                                                                                          | 頻度   | 頻度不明    |

## シロスタゾールOD錠100mg「JG」の相互作用

|                              |       |                                    |      |    |
|------------------------------|-------|------------------------------------|------|----|
| 1. 薬剤名等：抗凝固剤                 | 発現事象  | 出血した時出血を助長                         | 投与条件 | -  |
|                              | 理由・原因 | 本剤は血小板凝集抑制作用を有する                   | 指示   | 注意 |
| 2. 薬剤名等：血小板凝集を抑制する薬剤         | 発現事象  | 出血した時出血を助長                         | 投与条件 | -  |
|                              | 理由・原因 | 本剤は血小板凝集抑制作用を有する                   | 指示   | 注意 |
| 3. 薬剤名等：血栓溶解剤                | 発現事象  | 出血した時出血を助長                         | 投与条件 | -  |
|                              | 理由・原因 | 本剤は血小板凝集抑制作用を有する                   | 指示   | 注意 |
| 4. 薬剤名等：プロスタグランジンE1製剤及びその誘導体 | 発現事象  | 出血した時出血を助長                         | 投与条件 | -  |
|                              | 理由・原因 | 本剤は血小板凝集抑制作用を有する                   | 指示   | 注意 |
| 5. 薬剤名等：薬物代謝酵素を阻害する薬剤        | 発現事象  | 本剤の作用が増強                           | 投与条件 | -  |
|                              | 理由・原因 | これらの薬剤がCYP3A4を阻害することにより、本剤の血中濃度が上昇 | 指示   | 注意 |
| 6. 薬剤名等：グレープフルーツジュース         |       |                                    |      |    |

|       |                                             |      |    |
|-------|---------------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 本剤の作用が増強                                    | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | グレープフルーツジュースの成分がCYP3A4を阻害することにより、本剤の血中濃度が上昇 | 指示   | 注意 |

7. 薬剤名等：薬物代謝酵素を阻害する薬剤

|       |                                     |      |    |
|-------|-------------------------------------|------|----|
| 発現事象  | 本剤の作用が増強                            | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | これらの薬剤がCYP2C19を阻害することにより、本剤の血中濃度が上昇 | 指示   | 注意 |

8. 薬剤名等：ロバスタチン

|       |           |      |    |
|-------|-----------|------|----|
| 発現事象  | AUCが64%増加 | 投与条件 | -  |
| 理由・原因 | -         | 指示   | 注意 |

