

商品名 イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」 医薬品基本情報

薬効	3399 他に分類されない血液・体液用薬	一般名	イコサペント酸エチル300mgカプセル
英名	Ethyl icosapentate	剤型	カプセル
薬価	12.50	規格	300mg 1カプセル
メーカー	バイオメディクス	毒劇区分	

イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」の効能・効果

閉塞性動脈硬化症の(疼痛、冷感、潰瘍)の改善、高脂血症

イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」の使用制限等

1. 咯血、硝子体出血、血友病、出血、消化管潰瘍、尿路出血、毛細血管脆弱症、ミフェプリストン・ミソプロストール投与中	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 月経期間中、手術を予定、出血傾向、コントロール不良の高血圧症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」の副作用等

1. AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ビリルビン上昇、肝機能障害、黄疸、入院を要する心房細動、入院を要する心房粗動、心房細動	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 出血傾向、血尿、歯肉出血、眼底出血、鼻出血、消化管出血、貧血、嘔吐、食欲不振、口内炎、口渇、鼓腸、咳嗽、呼吸困難、めまい、眠気、不眠、関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙攣、こむら返り、顔面潮紅、ほてり、発熱、頻尿、全身倦怠感、血圧上昇、女性化乳房、耳鳴、発汗、ざ瘡	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 過敏症、発疹、そう痒感、皮下出血、悪心、胸やけ、腹部不快感、下痢、便秘、腹部膨満感、腹痛、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ビリルビン上昇、肝機能障害、BUN上昇、クレアチニン上昇、頭痛、頭重感、ふらつき、しびれ、浮腫、尿酸上昇、CK上昇、動悸	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 脳出血	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

イコサペント酸エチルカプセル300mg「YD」の相互作用

1. 薬剤名等：ミフェプリストン・ミソプロストール

発現事象	子宮出血の程度が悪化	投与条件	-
理由・原因	イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強	指示	禁止

2. 薬剤名等：抗凝固剤

発現事象	出血傾向	投与条件	-
理由・原因	イコサペント酸エチルは抗血小板作用を有するので、抗凝固剤、血小板凝集を抑制する薬剤との併用により相加的に出血傾向が増大	指示	注意

3. 薬剤名等：血小板凝集を抑制する薬剤

発現事象	出血傾向	投与条件	-
理由・原因	イコサペント酸エチルは抗血小板作用を有するので、抗凝固剤、血小板凝集を抑制する薬剤との併用により相加的に出血傾向が増大	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版『DIR』