

商品名 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」 医薬品基本情報

薬効	3399 他に分類されない血液・体液用薬	一般名	サルポグレラート塩酸塩50mg錠
英名	Sarpogrelate hydrochloride AMEL	剤型	錠
薬価	17.90	規格	50mg 1錠
メーカー	共和薬品	毒劇区分	

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」の効能・効果

慢性動脈閉塞症の(疼痛、冷感、虚血性諸症状、潰瘍)の改善

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」の使用制限等

1. 咯血、硝子体出血、血友病、出血、消化管潰瘍、尿路出血、毛細血管脆弱症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 月経期間中、出血傾向、出血傾向素因、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」の副作用等

1. 血小板減少、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、肝機能障害、黄疸、無顆粒球症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 脳出血、吐血、下血、消化管出血	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 過敏症、紅斑、蕁麻疹、嘔吐、口内炎、白血球減少、しびれ感、発熱、咽頭痛、咽頭不快感、咽頭灼熱感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 発疹、発赤、肝機能障害、ビリルビン上昇、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、出血傾向、出血、鼻出血、皮下出血、嘔気、胸やけ、腹痛、便秘、心悸亢進、頭痛、蛋白尿、尿潜血、BUN上昇、クレアチニン上昇、貧血、血清中性脂肪上昇、血清コレステロール上昇、血清アルブミン減少、尿糖、尿沈渣	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 丘疹、そう痒、食道異物感、食欲不振、腹部膨満感、下痢、息切れ、胸痛、ほてり、眠気、味覚異常、めまい、血小板減少、体重増加、浮腫、倦怠感、血清カルシウム減少

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

6. 胚胎仔死亡率増加、新生仔生存率低下

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

サルボグレラート塩酸塩錠50mg「アメル」の相互作用

1. 薬剤名等：抗凝固剤

発現事象 出血傾向を増強

投与条件 -

理由・原因 相互に作用を増強

指示 注意

2. 薬剤名等：血小板凝集抑制作用を有する薬剤

発現事象 出血傾向を増強

投与条件 -

理由・原因 相互に作用を増強

指示 注意

