

商品名 サルポグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」 医薬品基本情報

薬効	3399 他に分類されない血液・体液用薬	一般名	サルポグレラート塩酸塩50mg錠
英名	Sarpogrelate hydrochloride TEVA	剤型	錠
薬価	17.90	規格	50mg 1錠
メーカー	日医工岐阜工場	毒劇区分	

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」の効能・効果

慢性動脈閉塞症の(疼痛、冷感、虚血性諸症状、潰瘍)の改善

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」の使用制限等

1. 咯血、硝子体出血、血友病、出血、消化管潰瘍、尿路出血、毛細血管脆弱症	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 月経期間中、出血傾向、出血傾向素因、重篤な腎障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

サルポグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」の副作用等

1. 血小板減少、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、肝機能障害、黄疸、無顆粒球症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 脳出血、吐血、下血、消化管出血	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
3. 過敏症、紅斑、蕁麻疹、嘔吐、口内炎、白血球減少、しびれ感、発熱、咽頭痛、咽頭不快感、咽頭灼熱感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
4. 発疹、発赤、肝機能障害、ビリルビン上昇、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、出血傾向、出血、鼻出血、皮下出血、嘔気、胸やけ、腹痛、便秘、心悸亢進、頭痛、蛋白尿、尿潜血、BUN上昇、クレアチニン上昇、貧血、血清中性脂肪上昇、血清コレステロール上昇、血清アルブミン減少、尿糖、尿沈渣	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

5. 丘疹、そう痒、食道異物感、食欲不振、腹部膨満感、下痢、息切れ、胸痛、ほてり、眠気、味覚異常、めまい、血小板減少、体重増加、浮腫、倦怠感、血清カルシウム減少

記載場所 その他の副作用

頻度 0.1%未満

6. 胚胎仔死亡率増加、新生仔生存率低下

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

サルボグレラート塩酸塩錠50mg「テバ」の相互作用

1. 薬剤名等：抗凝固剤

発現事象 出血傾向を増強

投与条件 -

理由・原因 相互に作用を増強

指示 注意

2. 薬剤名等：血小板凝集抑制作用を有する薬剤

発現事象 出血傾向を増強

投与条件 -

理由・原因 相互に作用を増強

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』