

商品名 ドプテレット錠20mg 医薬品基本情報

薬効	3399 他に分類されない血液・体液用薬	一般名	アバトロンボパグマレイン酸塩錠
英名	Doptelet	剤型	錠
薬価	7106.60	規格	20mg 1錠
メーカー	S o b i J a p a n	毒劇区分	

ドプテレット錠20mgの効能・効果

慢性肝疾患の血小板減少症の改善

ドプテレット錠20mgの使用制限等

- 開胸を伴う観血的手技、開心を伴う観血的手技、開頭を伴う観血的手技、開腹を伴う観血的手技、臓器切除を伴う観血的手技
記載場所 効能・効果
注意レベル 禁止
- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴
記載場所 使用上の注意
注意レベル 禁止
- 重度肝機能障害<Child-Pugh分類C>
記載場所 使用上の注意
注意レベル 慎重投与
- 血小板数が $50000/\mu\text{L}$ 未満に低下していない
記載場所 用法・用量
注意レベル 注意
- 血栓症又はその既往、血栓塞栓症又はその既往、プロテインC欠損症、プロテインS欠損症、プロトロンビンG20210A変異、凝固第5因子ライデン変異、抗トロンビン欠損症、先天性血栓症の発現因子を有する、後天性血栓症の発現因子を有する、抗リン脂質抗体症候群、門脈血流速度低下、門脈血流速度 $10\text{cm}/\text{秒}$ 未満
記載場所 使用上の注意
注意レベル 注意

ドプテレット錠20mgの副作用等

- 血栓症、血栓塞栓症、門脈血栓症
記載場所 重大な副作用
頻度 5%未満

2. 末梢性浮腫、低ナトリウム血症

記載場所 その他の副作用

頻度 頻度不明

3. 疲労、発熱、悪心、腹痛、頭痛、貧血、筋肉痛、過敏症、そう痒、発疹、息詰まり、紅斑、咽頭浮腫、全身性そう痒症、斑状皮疹、顔面腫脹、舌腫脹

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

4. 血栓症、易出血性、血栓塞栓症、胎仔毒性、出生仔生存率低下、出生仔発育遅延、血小板数が過剰に増加、血栓性合併症、血栓塞栓性合併症、骨髓線維症、骨髓異形成症候群進行、血液悪性腫瘍進行

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.