

商品名 レブロジル皮下注用25mg 医薬品基本情報

薬効	3399 他に分類されない血液・体液用薬	一般名	ルスパテルセプト（遺伝子組換え）注射用
英名	Reblozyl	剤型	注射用
薬価	184552.00	規格	25mg 1瓶
メーカー	BMS	毒劇区分	(劇)

レブロジル皮下注用25mgの効能・効果

骨髄異形成症候群の貧血

レブロジル皮下注用25mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 赤血球輸血を受けていない	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. IPSS-Rによるリスク分類のHigh、IPSS-Rによるリスク分類のVery High	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意

レブロジル皮下注用25mgの副作用等

1. Grade3以上の副作用	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 悪心、下痢、嘔吐、頭痛、浮動性めまい、失神寸前状態、筋肉痛、骨痛、背部痛、関節痛、好中球減少症、血小板減少症、ALT増加、AST増加、血中クレアチニン増加、急性腎障害、呼吸困難、労作性呼吸困難、肺塞栓症、高血圧、急性心筋梗塞、注射部位反応、紅斑、疼痛、そう痒感、発疹、腫脹、過敏症、顔面浮腫、眼瞼浮腫、眼窩周囲浮腫、疲労、無力症、そう痒症、高尿酸血症、末梢性浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
3. 胚発生への影響、胎仔発生への影響、吸収胚数増加、着床後胚損失率増加、同腹仔数減少、骨格変異、抗体産生、髄外造血巣、高リスク骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病、造血器悪性腫瘍、リンパ腫、骨髄性白血病、リンパ性白血病、出生仔系球体腎炎、出生仔腎臓組織学的変化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

レボロジル皮下注用25mgの配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤

発現事象	-	投与条件	-
理由・原因	-	指示	禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版『DIR』