

商品名 スティセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液（2.5L 1袋（排液用バッグ付）） 医薬品基本情報

薬効	3420 腹膜透析用剤	一般名	腹膜透析液（4-5）
英名	Stay・safe	剤型	注射液
薬価	1258.00	規格	2.5L 1袋（排液用バッグ付）
メーカー	フレゼニウス メディカル ケア	毒劇区分	

スティセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液（2.5L 1袋（排液用バッグ付））の効能・効果

慢性腎不全の腹膜透析

スティセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液（2.5L 1袋（排液用バッグ付））の使用制限等

1. 横隔膜欠損、腹部挫滅傷、腹部熱傷、高度腹膜癒着、尿毒症に起因する以外の出血性素因、乳酸代謝障害又はその恐れ・疑い	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 1日5回以上の透析液交換に不都合、2L貯留を施行しているCAPD患者で透析不足による尿毒症症状	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 腹腔内臓器疾患又はその恐れ・疑い、腹膜損傷又はその恐れ・疑い、腹膜癒着又はその恐れ・疑い、腹膜炎又はその恐れ・疑い、腹部手術直後、大動脈部位における人工血管使用、重篤な肺疾患、糖代謝障害又はその恐れ・疑い、食事摂取不良、腹部ヘルニア、腰椎障害、憩室炎、人工肛門使用、高度換気障害、高度脂質代謝異常、高度肥満、高度低蛋白血症、免疫不全、ステロイド服用、ジギタリス治療中、血清カリウム値が正常、血清カリウム値が低値	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

スティセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液（2.5L 1袋（排液用バッグ付））の副作用等

1. 循環血液量減少、低血圧、ショック、被嚢性腹膜硬化症、EPS	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 筋痙攣、悪心、腹痛、腹部膨満感、嘔吐、下痢、便秘、痔核、腹膜炎、高血圧、低血圧、息切れ、胸水貯留、蕁麻疹、発疹、紅斑、皮膚そう痒症、高乳酸血症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、低カルシウム血症、低リン血症、低マグネシウム血症、代謝性アルカローシス、食欲不振、高コレステロール血症、高トリグリセライド血症、低蛋白血症、高血糖、肥満、アミノ酸喪失、水溶性ビタミン喪失、脱水、除水不良、ヘルニア、陰嚢水腫、発熱、筋肉痛、筋骨格痛、浮腫、倦怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

3. 被嚢性腹膜硬化症、EPS、イレウス症状、低栄養、るいそう、下痢、便秘、微熱、血性排液、局所性腹水貯留、びまん性腹水貯留、腸管ぜん動音低下、腹部における塊状物触知、除水能低下、腹膜透過性亢進、末梢白血球数増加、CRP陽性、低アルブミン血症、エリスロポエチン抵抗性貧血、高エンドトキシン血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
4. 呼吸困難、乳酸アシドーシス、細菌感染、肺機能低下、細菌性腹膜炎	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液（2.5L 1袋（排液用バッグ付））の相互作用

1. 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象	ジギタリス中毒	投与条件	-
理由・原因	本剤はカリウムを含まないため、血清カリウム値が低下	指示	注意

2. 薬剤名等：利尿剤

発現事象	水及び電解質異常	投与条件	-
理由・原因	本剤には除水効果があるため、併用により、脱水症状や電解質異常を起こす	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』