

商品名 レギュニール HCa 2.5腹膜透析液（5L 1袋） 医薬品基本情報

薬効	3420 腹膜透析用剤	一般名	腹膜透析液（9-2）
英名	Reguneal HCa	剤型	注射液
薬価	1717.00	規格	5L 1袋
メーカー	ヴァンティブ	毒劇区分	

レギュニール HCa 2.5腹膜透析液（5L 1袋）の効能・効果

慢性腎不全の腹膜透析

レギュニール HCa 2.5腹膜透析液（5L 1袋）の使用制限等

1. 横隔膜欠損、腹部挫滅傷、腹部熱傷、高度腹膜癒着、尿毒症に起因する以外の出血性素因、乳酸代謝障害又はその恐れ・疑い	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 1日5回以上の透析液交換に不都合、2L貯留を施行しているCAPD患者で透析不足による尿毒症症状	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 血漿中重炭酸濃度が30mEq/Lを超える、腹腔内臓器疾患又はその恐れ・疑い、腹膜損傷又はその恐れ・疑い、腹膜癒着又はその恐れ・疑い、腹膜炎又はその恐れ・疑い、乳酸アシドーシスを起こし易い体質、急性腎不全、先天性乳酸代謝障害、核酸系逆転写酵素阻害剤使用中、腹部手術直後、大動脈部位における人工血管使用、重篤な肺疾患、糖代謝障害又はその恐れ・疑い、食事摂取不良、腹部ヘルニア、腰椎障害、憩室炎、人工肛門使用、高度換気障害、高度脂質代謝異常、高度肥満、高度低蛋白血症、免疫不全、ステロイド服用、ジギタリス治療中、血清カリウム値が正常、血清カリウム値が低値	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

レギュニール HCa 2.5腹膜透析液（5L 1袋）の副作用等

1. 循環血液量減少、低血圧、ショック	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 顔面浮腫、末梢性浮腫、C－反応性蛋白増加、心胸郭比増加、体重増加、体液貯留	記載場所	その他の副作用

- 貧血、結膜出血、腹部膨満、腹膜炎、胸部不快感、倦怠感、浮腫、疼痛、口渇、鼻咽頭炎、処置合併症、 β 2ミクログロブリン増加、血中重炭酸塩減少、血中乳酸脱水素酵素増加、血液浸透圧上昇、血液pH低下、血中カリウム増加、血圧上昇、血中ナトリウム増加、血中尿素増加、炭酸ガス分圧上昇、白血球数減少、尿量減少、糖尿病、電解質失調、筋痙攣、頭痛、乳房腫脹、乳頭痛、高血圧
- 被嚢性腹膜硬化症、EPS、イレウス症状、低栄養、るいそう、下痢、便秘、微熱、血性排液、局所性腹水貯留、びまん性腹水貯留、腸管ぜん動音低下、腹部における塊状物触知、除水能低下、腹膜透過性亢進、末梢白血球数増加、CRP陽性、低アルブミン血症、エリスロポエチン抵抗性貧血、高エンドトキシン血症
- 呼吸困難、乳酸アシドーシス、代謝性アルカローシス、代謝性アルカローシス増悪、細菌感染、肺機能低下、細菌性腹膜炎、腹部不快感、腹痛、息切れ

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明
記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

レギュニール HCa 2.5腹膜透析液（5L 1袋）の相互作用

- 薬剤名等：核酸系逆転写酵素阻害剤使用中

発現事象 乳酸アシドーシス

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

- 薬剤名等：ジギタリス製剤

発現事象 ジギタリス中毒

理由・原因 本剤はカリウムを含まないため、血清カリウム値が低下

投与条件 -

指示 注意

- 薬剤名等：利尿剤

発現事象 水及び電解質異常

理由・原因 本剤には除水効果があるため、併用により、脱水症状や電解質異常を起こす

投与条件 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』