

商品名 ノベルジン錠50mg 医薬品基本情報

薬効	3929 その他の解毒剤	一般名	酢酸亜鉛水和物錠
英名	Nobelzin	剤型	錠
薬価	321.60	規格	50mg 1錠
メーカー	ノーベルファーマ	毒劇区分	(劇)

ノベルジン錠50mgの効能・効果

肝レンズ核変性症、ウィルソン病、低亜鉛血症

ノベルジン錠50mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

2. 肝機能障害

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

ノベルジン錠50mgの副作用等

1. 銅欠乏

記載場所	用法・用量
頻度	頻度不明

2. 銅欠乏症、銅欠乏、汎血球減少、貧血、神経障害、出血、胃潰瘍

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

3. リパーゼ増加、アミラーゼ増加、血清鉄減少

記載場所	その他の副作用
------	---------

4. 胃炎、口腔内痛、口腔内不快感、貧血、湿疹、発疹、めまい、食欲減退、変色便、倦怠感

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

5. 胃不快感、悪心、口内炎、嘔吐、腹痛、下痢、心窩部不快感、便秘、肝腫大、Al-P増加、AST増加、ALT増加、総ビリルビン増加、アンモニア増加、 γ -グ
ルタミルトランスフェラーゼ増加、急性膵炎、白血球数減少、白血球数増加、血小
板数減少、平均赤血球ヘモグロビン濃度減少、アレルギー性皮膚炎、皮膚そう痒症
、総コレステロール減少、アルブミン減少、尿潜血陽性、尿中蛋白陽性、HDL-
コレステロール減少、トリグリセリド増加、総蛋白減少、麦粒腫、膀胱炎、頭痛、
血清鉄増加、血清銅減少、咳嗽、発熱

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

6. アミラーゼ異常が長期持続、リパーゼ異常が長期持続

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

7. 血清銅濃度低下

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

8. 銅欠乏、小頭症児、心臓欠陥児、亜鉛誘発性銅欠乏、重度悪心、嘔吐、浮動性めま
い、腎不全、高血糖昏睡、出血性膵炎、死亡

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ノベルジン錠50mgの相互作用

1. 薬剤名等：食物

発現事象	本剤の効果が遅延
理由・原因	-

投与条件	ウィルソン病 （肝レンズ核変 性症）の場合、 同時
指示	注意

2. 薬剤名等：ポラプレジンク

発現事象	本剤の効果を増強
理由・原因	亜鉛含有製剤

投与条件	-
指示	注意

3. 薬剤名等：キレート剤

発現事象	本剤及びキレート剤の効果を減弱
理由・原因	同時投与した場合、本剤がキレートされ、本剤及びキレート剤の吸 収率が低下

投与条件	-
指示	注意

4. 薬剤名等：テトラサイクリン系抗生物質

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下

投与条件	-
指示	注意

5. 薬剤名等：キノロン系抗菌剤

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意

6. 薬剤名等：セフジニル

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意

7. 薬剤名等：経口鉄剤

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意

8. 薬剤名等：ビスホスホネート系製剤

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意

9. 薬剤名等：エルトロンボパグ オラミン

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意

10. 薬剤名等：ドルテグラビルナトリウム

発現事象	本剤及びこれらの薬剤の効果を減弱	投与条件	-
理由・原因	同時投与した場合、本剤及びこれらの薬剤の吸収率が低下	指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』