

商品名 ユリス錠1mg 医薬品基本情報

薬効	3949 その他の痛風治療剤	一般名	ドチヌラド錠
英名	Urece	剤型	錠
薬価	42.40	規格	1mg 1錠
メーカー	富士薬品	毒劇区分	

ユリス錠1mgの効能・効果

高尿酸血症、痛風

ユリス錠1mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、乏尿、無尿	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 尿路結石	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	原則禁止
3. 尿が酸性、重度腎機能障害、eGFRが30mL／min／1.73m ² 未満、肝機能障害、重篤な肝疾患、ALT 100IU／L以上、AST 100IU／L以上	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ユリス錠1mgの副作用等

1. 痛風関節炎、痛風発作	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 下痢、悪心、ALT増加、AST増加、発疹、皮膚そう痒症、倦怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 軟便、γ-GTP増加、関節炎、四肢不快感、関節痛、腎結石、腎石灰沈着症、尿中β2ミクログロブリン増加、血中クレアチニン増加、尿中アルブミン／クレアチニン比増加、尿中アルブミン陽性	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 尿路結石、血尿、腎仙痛

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

5. 重篤な肝障害

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

6. 重篤な肝障害、骨格変異

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ユリス錠1mgの相互作用

1. 薬剤名等：ピラジナミド

発現事象 本剤の効果が減弱

投与条件 -

理由・原因 ピラジナミドの代謝物がURAT1による尿酸再吸収を促進することが知られており、本剤の尿酸排泄促進に拮抗

指示 注意

2. 薬剤名等：サリチル酸製剤

発現事象 本剤の効果が減弱

投与条件 -

理由・原因 サリチル酸製剤は尿酸の排泄を抑制することが知られており、本剤の尿酸排泄促進に拮抗

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』