

商品名 ラスリテック点滴静注用7.5mg 医薬品基本情報

薬効	3959 その他の酵素製剤	一般名	ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）静注用
英名	Rasuritek	剤型	静注用
薬価	28774.00	規格	7.5mg 1瓶（溶解液付）
メーカー	サノフィ	毒劇区分	(劇)

ラスリテック点滴静注用7.5mgの効能・効果

がん化学療法の高尿酸血症

ラスリテック点滴静注用7.5mgの使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、グルコース-6-リン酸脱水素酵素<G6PD>欠損、溶血性貧血を引き起こすことが知られている赤血球酵素異常	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. がん化学療法後に発症した高尿酸血症	記載場所	効能・効果
	注意レベル	注意
3. 抗ラスブリカーゼ抗体陽性、アレルギーを起こし易い体質	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ラスリテック点滴静注用7.5mgの副作用等

1. ショック、アナフィラキシー、アナフィラキシーショック、重篤な過敏症、溶血性貧血、貧血症状、メトヘモグロビン血症、チアノーゼ	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 肝機能障害、AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、総ビリルビン上昇、電解質異常、Na異常、K異常、P異常、アレルギー反応、発熱	記載場所	その他の副作用
3. 下痢、腹痛、口内炎、呼吸困難、気管支痙攣、鼻炎、背部痛、顎痛、Ca異常、Mg異常、高血圧、徐脈、低血圧、感染、肺炎、敗血症、粘膜炎症、浮腫、疲労感、疼痛、カテーテル留置部位反応、カテーテル留置部位紅斑、カテーテル留置部位出血、カテーテル留置部位疼痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

4. 白血球減少、貧血、溶血、血小板減少、ヘモグロビン減少、APTT延長、便秘、悪心、嘔吐、食欲不振、心窩部不快感、咽喉頭不快感、LDH上昇、γ-GTP上昇、尿蛋白、排尿困難、血尿、BUN上昇、尿潜血陽性、頭痛、めまい、発疹、皮膚そう痒、脱毛、蕁麻疹、低酸素症、胸膜炎、四肢痛、血糖上昇、総蛋白減少、アミラーゼ上昇、アルブミン低下、注射部位反応、注射部位硬結、注射部位紅斑、倦怠感、ほてり
5. アナフィラキシーショック、重篤な過敏症、溶血性貧血、メトヘモグロビン血症、重篤な溶血性貧血、抗ラスブリカーゼ抗体発現、中和抗体発現、重篤なアレルギー症状、心臓奇形、血管奇形、着床後胚損失率増加、死亡胎仔数増加、吸収胚数増加、生存胎仔数減少、胎仔重量減少、胎仔骨格発生への影響

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ラスリテック点滴静注用7.5mgの配合変化

1. 薬剤名等：ブドウ糖液

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：他の併用薬

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

