

商品名 アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」 医薬品基本情報

薬効	3959 その他の酵素製剤	一般名	アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）注射液（1）
英名	Agalsidase beta BS JCR	剤型	注射液
薬価	70498.00	規格	5mg 1瓶
メーカー	J C R ファーマ	毒劇区分	（劇）

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」の効能・効果

ファブリー病

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」の使用制限等

1. 類薬でアナフィラキシーショックの既往歴、本剤成分又は含有成分でアナフィラキシーショックの既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」の副作用等

1. Infusion reaction、悪寒、発熱、体温変動感、悪心、高血圧、嘔吐、潮紅、錯感覚、ファブリー痛、疲労、疼痛、四肢痛、頭痛、そう痒症、胸痛、胸部不快感、低血圧、頻脈、動悸、徐脈、呼吸困難、喘鳴、咽喉絞扼感、咳嗽、鼻炎、発疹、蕁麻疹、流涙増加、腹痛、筋痛、浮動性めまい、蒼白、酸素飽和度低下、浮腫	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 頻脈、悪心、嘔吐、腹痛、悪寒、発熱、冷感、疲労、胸部不快感、熱感、血圧上昇、体温上昇、四肢痛、頭痛、錯感覚、ファブリー痛、浮動性めまい、傾眠、呼吸困難、皮膚そう痒症、蕁麻疹、潮紅	記載場所	その他の副作用
3. 頻脈、体温変動感、筋肉痛、鼻炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明

4. 好酸球増加症、徐脈、動悸、流涙増加、悪心、腹痛、嘔吐、胸痛、悪寒、発熱、疲労、末梢性浮腫、胃腸炎、疼痛、背部痛、頭痛、錯感覚、呼吸困難、咳嗽、呼吸窮迫、喘鳴、皮膚そう痒症、蕁麻疹、発疹、潮紅、高血圧、低血圧、上腹部痛、腹部不快感、胃不快感、口の感覚鈍麻、無力症、倦怠感、顔面浮腫、高熱、心拍数増加、血圧低下、筋痛、筋痙攣、関節痛、筋緊張、筋骨格硬直、感覚鈍麻、灼熱感、嗜眠、鼻閉、咽喉絞扼感、呼吸困難増悪、紅斑、全身性そう痒症、血管神経性浮腫、顔面腫脹、蒼白、ほてり

記載場所	その他の副作用
------	---------

頻度	5%未満
----	------

5. IgG抗体産生

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

6. 重篤なアナフィラキシー、重篤なinfusion reaction、アナフィラキシーショック、infusion reaction、IR、軽度～中等度のIR、軽度～中等度のIR再発、重度のIR、重度のIR再発、IgE陽性、皮膚試験陽性、肝細胞壊死

記載場所	使用上の注意
------	--------

頻度	頻度不明
----	------

アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」の配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象	-
------	---

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	禁止
----	----

