

商品名 ミグリトール錠75mg「トーフ」 医薬品基本情報

薬効	3969 その他の糖尿病用剤	一般名	ミグリトール錠
英名	Miglitol TOWA	剤型	錠
薬価	10.60	規格	75mg 1錠
メーカー	東和薬品	毒劇区分	

ミグリトール錠75mg「トーフ」の効能・効果

糖尿病の食後過血糖の改善

ミグリトール錠75mg「トーフ」の使用制限等

1. 重症ケトーシス、糖尿病性前昏睡、糖尿病性昏睡、重症感染症、重篤な外傷、手術前後、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 開腹手術の既往、腸閉塞の既往、消化・吸収障害を伴った慢性腸疾患、ロエムヘルド症候群、重度ヘルニア、大腸狭窄、大腸潰瘍、重篤な腎機能障害、重篤な肝機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ミグリトール錠75mg「トーフ」の副作用等

1. 低血糖、低血糖症状、腹部膨満、鼓腸、放屁増加、腸閉塞、持続する腹痛、嘔吐、AST上昇、ALT上昇、肝機能障害、黄疸	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 低血糖	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
3. 腹部膨満、鼓腸、下痢	記載場所	その他の副作用
4. 口内炎、味覚異常、腸管囊胞様気腫症、しびれ、眠気、倦怠感、浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 便秘、腸雑音異常、腹痛、嘔気、嘔吐、食欲不振、口渇、消化不良、胃不快感、おくび、胃炎、排便障害、痔核、過敏症、発疹、紅斑、蕁麻疹、そう痒、ALT上昇、AST上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、Al-P上昇、めまい、頭痛、白血球数減少、血中アミラーゼ増加、血中カリウム増加、血中尿酸増加、頻尿、咳嗽	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

6. 低血糖、下痢、腹部膨満、腹痛

記載場所	使用上の注意
------	--------

7. 腹部膨満、鼓腸、下痢、消化器系副作用、腸閉塞、母動物摂餌量低下、体重増加抑制、胎仔体重低下、胎仔骨化遅延、胎仔死亡率増加

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

ミグリトール錠75mg「トーフ」の相互作用

1. 薬剤名等：糖尿病用薬

発現事象	低血糖症状
------	-------

投与条件	-
------	---

理由・原因	併用糖尿病用薬の血糖降下作用に本剤の糖質吸収遅延作用が加わる
-------	--------------------------------

指示	慎重投与
----	------

2. 薬剤名等：糖尿病用薬の血糖降下作用を増強する薬剤

発現事象	本剤の糖質吸収遅延作用が加わる
------	-----------------

投与条件	糖尿病用薬及びその血糖降下作用を増強する薬剤の併用に加え更に本剤を併用
------	-------------------------------------

理由・原因	併用薬剤により他の糖尿病用薬の血糖降下作用が増強されるところに、本剤の糖質吸収遅延作用が加わる
-------	---

指示	注意
----	----

3. 薬剤名等：糖尿病用薬の血糖降下作用を減弱する薬剤

発現事象	本剤の糖質吸収遅延作用が加わる
------	-----------------

投与条件	糖尿病用薬及びその血糖降下作用を減弱する薬剤の併用に加え更に本剤を併用
------	-------------------------------------

理由・原因	併用薬剤により他の糖尿病用薬の血糖降下作用が減弱されるところに、本剤の糖質吸収遅延作用が加わる
-------	---

指示	注意
----	----

4. 薬剤名等：プロプラノロール

発現事象	生物学的利用率が低下
------	------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----

5. 薬剤名等：ラニチジン

発現事象	生物学的利用率が低下
------	------------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----

6. 薬剤名等：ジゴキシン

発現事象	血漿中濃度が低下
------	----------

投与条件	-
------	---

理由・原因	-
-------	---

指示	注意
----	----



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.