

商品名 ネシーナ錠25mg 医薬品基本情報

薬効	3969 その他の糖尿病用剤	一般名	アログリプチン安息香酸塩錠
英名	Nesina	剤型	錠
薬価	156.70	規格	25mg 1錠
メーカー	帝人ファーマ	毒劇区分	

ネシーナ錠25mgの効能・効果

2型糖尿病

ネシーナ錠25mgの使用制限等

1. 重症ケトーシス、糖尿病性前昏睡、糖尿病性昏睡、1型糖尿病、重症感染症、重篤な外傷、手術前後、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 中等度以上の腎機能障害、中等度腎機能障害、1. 2mg/dL<血清クレアチニン≤2. 0mg/dLの女性、1. 4mg/dL<血清クレアチニン≤2. 4mg/dLの男性、30mL/min≤クレアチンクリアランス<50mL/min、高度腎機能障害、クレアチンクリアランス<30mL/min、血清クレアチニン>2. 0mg/dLの女性、血清クレアチニン>2. 4mg/dLの男性、末期腎不全	記載場所	用法・用量
	注意レベル	注意
3. 心不全<NYHA分類3~4>、低血糖又はその恐れ・疑い、脳下垂体機能不全、副腎機能不全、栄養不良状態、飢餓状態、不規則な食事摂取、食事摂取量不足、激しい筋肉運動、過度のアルコール摂取、腸閉塞の既往、腹部手術の既往、中等度以上の腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ネシーナ錠25mgの副作用等

1. 咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音異常、捻髪音、間質性肺炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 重篤な低血糖症状、意識消失、低血糖症状、急性膵炎、持続的な激しい腹痛、嘔吐、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいALP上昇、肝機能障害、黄疸、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑、筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中ミオグロビン上昇、尿中ミオグロビン上昇、横紋筋融解症、腸閉塞、高度便秘、腹部膨満、持続する腹痛、類天疱瘡、水疱、びらん	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明

3. 低血糖

記載場所 重大な副作用

頻度 5%未満

4. 過敏症、発疹、そう痒、じん麻疹、腹部膨満、鼓腸、腹痛、胃腸炎、便秘、頭痛、めまい、四肢のしびれ、倦怠感、鼻咽頭炎、浮腫、動悸、関節痛、筋肉痛、貧血

記載場所 その他の副作用

頻度 5%未満

5. 低血糖、腸閉塞

記載場所 使用上の注意

頻度 頻度不明

ネシーナ錠25mgの相互作用

1. 薬剤名等：糖尿病用薬

発現事象 低血糖

投与条件 -

理由・原因 血糖降下作用が増強

指示 注意

2. 薬剤名等：チアゾリジン系薬剤

発現事象 浮腫

投与条件 -

理由・原因 循環血漿量が増加

指示 注意

3. 薬剤名等：糖尿病用薬の血糖降下作用を増強する薬剤

発現事象 血糖が低下

投与条件 -

理由・原因 血糖降下作用が増強

指示 注意

4. 薬剤名等：糖尿病用薬の血糖降下作用を減弱する薬剤

発現事象 血糖が上昇

投与条件 -

理由・原因 血糖降下作用が減弱

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』