

商品名 テネリアOD錠40mg 医薬品基本情報

薬効	3969 その他の糖尿病用剤	一般名	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠
英名	Tenelia OD	剤型	錠
薬価	147.30	規格	40mg 1錠
メーカー	田辺三菱製薬	毒劇区分	

テネリアOD錠40mgの効能・効果

2型糖尿病

テネリアOD錠40mgの使用制限等

- 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、重症ケトーシス、糖尿病性前昏睡、糖尿病性昏睡、1型糖尿病、重症感染症、重篤な外傷、手術前後
- 心不全<NYHA分類3～4>、栄養不良状態、過度のアルコール摂取、飢餓状態、脳下垂体機能不全、激しい筋肉運動、不規則な食事摂取、副腎機能不全、食事摂取量不足、腸閉塞の既往、腹部手術の既往、QT延長を起こし易い体質、QT延長の既往、先天性QT延長症候群の既往、Torsades de pointesの既往、不整脈又はその既往、重度徐脈又はその既往、心疾患、低カリウム血症、うっ血性心不全、高度肝機能障害、Child-Pugh分類で合計スコア9超

記載場所	使用上の注意
注意レベル	禁止

記載場所	使用上の注意
注意レベル	注意

テネリアOD錠40mgの副作用等

- 低血糖
- 咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音異常、捻髪音、間質性肺炎
- 重篤な低血糖症状、意識消失、低血糖症状、AST上昇、ALT上昇、肝機能障害、類天疱瘡、水疱、びらん、急性膵炎、持続的な激しい腹痛、嘔吐
- 腸閉塞、高度便秘、腹部膨満、持続する腹痛、嘔吐

記載場所	重大な副作用
------	--------

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

記載場所	重大な副作用
頻度	頻度不明

記載場所	重大な副作用
頻度	5%未満

5. 浮動性めまい、関節痛、末梢性浮腫

記載場所	その他の副作用
頻度	頻度不明

6. 便秘、腹部膨満、腹部不快感、悪心、腹痛、鼓腸、口内炎、胃ポリープ、結腸ポリープ、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、下痢、食欲減退、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、AST上昇、ALT上昇、 γ -GTP上昇、蛋白尿、尿ケトン体陽性、尿潜血、湿疹、発疹、皮膚そう痒、アレルギー性皮膚炎、CK上昇、血清カリウム上昇、倦怠感、アレルギー性鼻炎、血清尿酸上昇

記載場所	その他の副作用
頻度	5%未満

7. ALP上昇

記載場所	その他の副作用
頻度	0.1%未満

8. 低血糖、腸閉塞、QT延長、尾表皮剥脱、尾表皮痂皮、尾表皮潰瘍、四肢表皮剥脱、四肢表皮痂皮、四肢表皮潰瘍、耳介表皮剥脱、耳介表皮痂皮、耳介表皮潰瘍、皮膚症状

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

テネリアOD錠40mgの相互作用

1. 薬剤名等：糖尿病用薬

発現事象	低血糖症状
理由・原因	血糖降下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

2. 薬剤名等：血糖降下作用を増強する薬剤

発現事象	更に血糖が低下
理由・原因	血糖降下作用が増強

投与条件	-
指示	注意

3. 薬剤名等：血糖降下作用を減弱する薬剤

発現事象	血糖が上昇
理由・原因	血糖降下作用が減弱

投与条件	-
指示	注意

4. 薬剤名等：QT延長を起こすことが知られている薬剤

発現事象	QT延長
理由・原因	これらの薬剤では単独投与でもQT延長

投与条件	-
指示	注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』

