

商品名 ミゾリビン錠25mg「サワイ」 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	ミゾリビン25mg錠
英名	Mizoribine	剤型	錠
薬価	43.60	規格	25mg 1錠
メーカー	沢井製薬	毒劇区分	

ミゾリビン錠25mg「サワイ」の効能・効果

腎移植の拒否反応の抑制、原発性糸球体疾患のネフローゼ症候群<頻回再発型のネフローゼ症候群を除く>、ループス腎炎、関節リウマチ

ミゾリビン錠25mg「サワイ」の使用制限等

1. 本剤成分又は含有成分で重篤な過敏症の既往歴、白血球数3000/mm ³ 以下	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 腎機能障害	記載場所	用法・用量
	注意レベル	慎重投与
3. 骨髓機能抑制、感染症、肝炎ウイルスキャリア、B型肝炎ウイルスキャリア、HBs抗原陰性、C型肝炎ウイルスキャリア、出血性素因、腎機能障害	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

ミゾリビン錠25mg「サワイ」の副作用等

1. 骨髓機能抑制	記載場所	用法・用量
	頻度	頻度不明
2. 重篤な血液障害、B型肝炎ウイルス再活性化による肝炎、C型肝炎悪化、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、間質性肺炎、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、中毒性表皮壊死症、Lyell症候群、重篤な皮膚障害、紅斑、そう痒感、眼充血、口内炎、腭炎	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 骨髓機能抑制、汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、血小板減少、赤血球減少、ヘマトクリット値低下、感染症、肺炎、髄膜炎、敗血症、带状疱疹、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、肝機能障害、黄疸、消化管潰瘍、消化管出血、消化管穿孔、高血糖、糖尿病	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満

4. 急性腎障害	記載場所	重大な副作用
	頻度	0.1%未満
5. 代謝異常、痛風、眼球充血	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 腎機能異常、蛋白尿、血尿、BUN上昇、クレアチニン上昇、肝機能異常、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、LAP上昇、ビリルビン上昇、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、便秘、口内炎、舌炎、過敏症、発疹、そう痒感、発熱、尿酸値上昇、脱毛、めまい、頭痛、味覚異常、しびれ、全身倦怠感、浮腫、口渇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 腹部膨満感、軟便、舌苔、眠気、耳鳴、四肢異常知覚、ガンマグロブリン低下、動悸、悪寒、ほてり、月経異常、胸痛	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
8. 骨髄機能抑制	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. B型肝炎ウイルス再活性化、C型肝炎悪化	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 重篤な感染症、出血傾向、感染症、感染症増悪、出血傾向増悪、尿酸値上昇、B型肝炎ウイルス再活性化による肝炎、C型肝炎悪化、骨髄機能抑制、急性腎障害、催奇形性、催奇形作用、悪性腫瘍、悪性リンパ腫、皮膚癌	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ミゾリピン錠25mg「サワイ」の相互作用

1. 薬剤名等：生ワクチン

発現事象 ワクチン由来の感染を増強又は持続

理由・原因 免疫機能が抑制された患者への生ワクチン接種により、感染の可能性が増加

投与条件 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：不活化ワクチン

発現事象 効果が得られない

理由・原因 免疫抑制作用により、ワクチンに対する免疫が得られない

投与条件 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.