

商品名 リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
英名	Risedronate Na	剤型	錠
薬価	93.20	規格	17.5mg 1錠
メーカー	ヴィアトリス・ヘルスケア	毒劇区分	(劇)

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」の効能・効果

骨粗鬆症、骨ページェット病

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」の使用制限等

- 食道狭窄、アカラシア、食道弛緩不能症、食道通過を遅延させる障害、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、低カルシウム血症、立位を30分以上保てない、坐位を30分以上保てない、高度腎機能障害、クレアチニンクリアランス値：約30mL／分未満、クレアチニンクリアランス値が約30mL／分未満、eGFRが30mL／分／1.73m²未満
- 歯科処置の既往、悪性腫瘍、抜歯、放射線療法、顎骨に対する局所感染、化学療法、コルチコステロイド治療、口腔の不衛生、顎骨に対する侵襲的歯科処置、血管新生阻害薬治療、耳感染、耳外傷、胃潰瘍、嚥下困難、十二指腸潰瘍、食道炎、食道潰瘍、上部消化管障害、軽度腎機能障害、中等度腎機能障害

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」の副作用等

- 食道炎、食道潰瘍
- 上部消化管障害、食道穿孔、食道狭窄、食道潰瘍、食道炎、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下非定型骨折、近位大腿骨骨幹部非定型骨折、近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折
- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 胃不快感

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 0.1%未満

記載場所 その他の副作用

5. 軟便、おくび、舌炎、十二指腸炎、鼓腸、歯肉腫脹、過敏症、じん麻疹、皮膚炎、水疱性皮膚炎、血管浮腫、LDH増加、眼痛、ぶどう膜炎、好中球数減少、リンパ球数増加、耳鳴、尿中 β 2ミクログロブリン増加、脱毛	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 便秘、上腹部痛、悪心、胃炎、下痢、腹部膨満感、消化不良、胸やけ、味覚異常、口内炎、口渇、嘔吐、食欲不振、そう痒症、発疹、紅斑、 γ -GTP増加、AST増加、ALT増加、血中ALP増加、霧視、貧血、白血球数減少、めまい、頭痛、感覚減退、しびれ、傾眠、筋痛、骨格痛、関節痛、背部痛、骨痛、顎部痛、血中カルシウム減少、尿潜血陽性、倦怠感、BUN増加、血中ALP減少、血中リン減少、浮腫、顔面浮腫、四肢浮腫、ほてり、無力症、疲労、脱力、動悸、血圧上昇、発熱	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
7. 大腿部痛、鼠径部痛、前腕部痛、前駆痛	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 片側非定型骨折	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、非外傷性大腿骨転子下非定型骨折、軽微な外力による大腿骨転子下非定型骨折、非外傷性近位大腿骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位大腿骨骨幹部非定型骨折、非外傷性近位尺骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折、低カルシウム血症、補正血清カルシウム値が8mg/dL未満、母動物死亡、胎仔骨化遅延	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」の相互作用

1. 薬剤名等：水以外の飲料	発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	同時
	理由・原因	-	指示	注意
2. 薬剤名等：Ca・Mg等の含量の特に高いミネラルウォーター	発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	同時
	理由・原因	-	指示	注意
3. 薬剤名等：食物	発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	同時
	理由・原因	-	指示	注意
4. 薬剤名等：他の薬剤と服用	発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	同時
	理由・原因	-	指示	注意
5. 薬剤名等：カルシウム補給剤				

発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

6. 薬剤名等：カルシウム含有製剤

発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

7. 薬剤名等：アルミニウム含有製剤

発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

8. 薬剤名等：マグネシウム含有製剤

発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

9. 薬剤名等：化学療法

発現事象	顎骨壊死、顎骨骨髓炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

10. 薬剤名等：血管新生阻害薬治療

発現事象	顎骨壊死、顎骨骨髓炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

11. 薬剤名等：コルチコステロイド治療

発現事象	顎骨壊死、顎骨骨髓炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

12. 薬剤名等：放射線療法

発現事象	顎骨壊死、顎骨骨髓炎	投与条件	-
理由・原因	-	指示	注意

13. 薬剤名等：水以外の飲料

発現事象	-	投与条件	同時
理由・原因	本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成	指示	注意

14. 薬剤名等：食物

発現事象	-	投与条件	同時
理由・原因	本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成	指示	注意

15. 薬剤名等：牛乳

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

16. 薬剤名等：乳製品

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

17. 薬剤名等：高カルシウム含有飲食物

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

18. 薬剤名等：多価陽イオン含有製剤

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

