

## 商品名 アクトネル錠75mg 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	リセドロン酸ナトリウム水和物錠
英名	Actonel	剤型	錠
薬価	1170.10	規格	75mg 1錠
メーカー	E Aファーマ	毒劇区分	(劇)

## アクトネル錠75mgの効能・効果

骨粗鬆症

## アクトネル錠75mgの使用制限等

- 食道狭窄、アカラシア、食道弛緩不能症、食道通過を遅延させる障害、類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴、低カルシウム血症、立位を30分以上保てない、坐位を30分以上保てない、高度腎機能障害、クレアチニンクリアランス値：約30mL/分未満、クレアチニンクリアランス値が約30mL/分未満、eGFRが30mL/分/1.73m<sup>2</sup>未満
- 歯科処置の既往、悪性腫瘍、抜歯、放射線療法、顎骨に対する局所感染、化学療法、コルチコステロイド治療、口腔の不衛生、顎骨に対する侵襲的歯科処置、血管新生阻害薬治療、耳感染、耳外傷、胃潰瘍、嚥下困難、十二指腸潰瘍、食道炎、食道潰瘍、上部消化管障害、軽度腎機能障害、中等度腎機能障害

記載場所 使用上の注意

注意レベル 禁止

記載場所 使用上の注意

注意レベル 注意

## アクトネル錠75mgの副作用等

- 食道炎、食道潰瘍
- 上部消化管障害、食道穿孔、食道狭窄、食道潰瘍、胃潰瘍、食道炎、十二指腸潰瘍、著しいAST上昇、著しいALT上昇、著しいγ-GTP上昇、肝機能障害、黄疸、顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下非定型骨折、近位大腿骨骨幹部非定型骨折、近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折

記載場所 用法・用量

頻度 頻度不明

記載場所 重大な副作用

頻度 頻度不明

- 下痢

記載場所 その他の副作用

4. 口内炎、口渇、食欲不振、軟便、おくび、舌炎、十二指腸炎、鼓腸、味覚異常、歯肉腫脹、過敏症、紅斑、そう痒症、発疹、皮膚炎、水疱性皮膚炎、血管浮腫、AST増加、ALT増加、LDH増加、血中AL-P増加、眼痛、霧視、ぶどう膜炎、貧血、好中球数減少、リンパ球数増加、めまい、感覚減退、しびれ、耳鳴、傾眠、血中カルシウム減少、尿潜血陽性、尿中β2ミクログロブリン増加、血中AL-P減少、血中リン減少、ほてり、動悸、脱毛、血圧上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
5. 胃不快感、胃炎、上腹部痛、悪心、嘔吐、急性期反応、インフルエンザ様症状、便秘、消化不良、胸やけ、腹部膨満感、じん麻疹、γ-GTP増加、白血球数減少、頭痛、筋痛、骨格痛、関節痛、背部痛、骨痛、頸部痛、発熱、倦怠感、無力症、疲労、脱力、BUN増加、浮腫、顔面浮腫、四肢浮腫	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
6. 大腿部痛、鼠径部痛、前腕部痛、前駆痛	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 片側非定型骨折	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、非外傷性大腿骨転子下非定型骨折、軽微な外力による大腿骨転子下非定型骨折、非外傷性近位大腿骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位大腿骨骨幹部非定型骨折、非外傷性近位尺骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折、低カルシウム血症、補正血清カルシウム値が8mg/dL未満、母動物死亡、胎仔骨化遅延	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## アクトネル錠75mgの相互作用

1. 薬剤名等：水以外の飲料		
発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件 同時
理由・原因	-	指示 注意
2. 薬剤名等：Ca・Mg等の含量の特に高いミネラルウォーター		
発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件 同時
理由・原因	-	指示 注意
3. 薬剤名等：食物		
発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件 同時
理由・原因	-	指示 注意
4. 薬剤名等：他の薬剤と服用		
発現事象	本剤の吸収を妨げる	投与条件 同時
理由・原因	-	指示 注意
5. 薬剤名等：カルシウム補給剤		

	<b>発現事象</b> 本剤の吸収を妨げる	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
6.	薬剤名等：カルシウム含有製剤	
	<b>発現事象</b> 本剤の吸収を妨げる	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
7.	薬剤名等：アルミニウム含有製剤	
	<b>発現事象</b> 本剤の吸収を妨げる	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
8.	薬剤名等：マグネシウム含有製剤	
	<b>発現事象</b> 本剤の吸収を妨げる	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
9.	薬剤名等：化学療法	
	<b>発現事象</b> 顎骨壊死、顎骨骨髓炎	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
10.	薬剤名等：血管新生阻害薬治療	
	<b>発現事象</b> 顎骨壊死、顎骨骨髓炎	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
11.	薬剤名等：コルチコステロイド治療	
	<b>発現事象</b> 顎骨壊死、顎骨骨髓炎	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
12.	薬剤名等：放射線療法	
	<b>発現事象</b> 顎骨壊死、顎骨骨髓炎	<b>投与条件</b> -
	<b>理由・原因</b> -	<b>指示</b> 注意
13.	薬剤名等：水以外の飲料	
	<b>発現事象</b> -	<b>投与条件</b> 同時
	<b>理由・原因</b> 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成	<b>指示</b> 注意
14.	薬剤名等：食物	
	<b>発現事象</b> -	<b>投与条件</b> 同時
	<b>理由・原因</b> 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成	<b>指示</b> 注意

15. 薬剤名等：牛乳

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

16. 薬剤名等：乳製品

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

17. 薬剤名等：高カルシウム含有飲食物

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

18. 薬剤名等：多価陽イオン含有製剤

発現事象 -

投与条件 同時

理由・原因 本剤の吸収が妨げられる、カルシウム等と錯体を形成

指示 注意

