

商品名 ダブロック錠2mg 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	ダプロデュスタット錠
英名	Duvroq	剤型	錠
薬価	157.40	規格	2mg 1錠
メーカー	G S K	毒劇区分	(劇)

ダブロック錠2mgの効能・効果

腎性貧血

ダブロック錠2mgの使用制限等

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 鉄欠乏時、心筋梗塞又はその既往、脳梗塞又はその既往、肺塞栓又はその既往、高血圧症、悪性腫瘍、黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症、増殖糖尿病網膜症、滲出性加齢黄斑変性症、心不全又はその既往、肝機能障害 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

ダブロック錠2mgの副作用等

- | | | |
|----------------------------------|------|---------|
| 1. バスキュラーアクセス血栓症、シャント閉塞 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 脳梗塞、肺塞栓症、網膜静脈閉塞、深部静脈血栓症、血栓塞栓症 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 5%未満 |
| 3. 便秘、末梢性浮腫 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 4. 網膜出血、過敏症、発疹、皮膚炎、蕁麻疹、高血圧、腹痛 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 5%未満 |

5. 死亡、心血管系障害、脳卒中	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 血圧上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓、重篤な血栓塞栓症、死亡、血栓塞栓症、ヘモグロビン濃度が2.0g/dLを超える急激な上昇、網膜出血、心不全、頭痛、胃腸障害、悪心、腹痛	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ダーブロック錠2mgの相互作用

1. 薬剤名等：CYP2C8阻害剤

発現事象	本剤の作用が増強	投与条件	-
理由・原因	本剤をゲムフィブロジル（国内未承認）と併用したところ、本剤の血中濃度が上昇、クロピドグレル等のCYP2C8阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇	指示	注意

2. 薬剤名等：リファンピシン

発現事象	本剤の作用が減弱	投与条件	-
理由・原因	リファンピシンのCYP2C8誘導作用により、本剤の血中濃度が低下	指示	注意

