

商品名 エルシトニン注20Sディスポ 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	エルカトニンキット
英名	Elcitonin S	剤型	キット類
薬価	688.00	規格	20エルカトニン単位1mL 1筒
メーカー	旭化成ファーマ	毒劇区分	(劇)

エルシトニン注20Sディスポの効能・効果

骨粗鬆症における疼痛

エルシトニン注20Sディスポの使用制限等

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. 本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 過敏症状を起し易い体質、紅斑を起し易い体質、発疹を起し易い体質、膨疹を起し易い体質、気管支喘息又はその既往 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

エルシトニン注20Sディスポの副作用等

- | | | |
|--|------|---------|
| 1. ショック、アナフィラキシー、血圧低下、気分不良、全身発赤、蕁麻疹、呼吸困難、咽頭浮腫、低カルシウム血症性テタニー、AST上昇、ALT上昇、ALP上昇、肝機能障害、黄疸 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 2. 喘息発作 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 0.1%未満 |
| 3. しびれ感、乳房肥大、乳房痛 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |
| 4. 過敏症、発疹、顔面潮紅、熱感、悪心、嘔吐、腹痛、AST上昇、ALT上昇、疼痛、そう痒感、全身倦怠感、赤血球減少、BUN上昇、ALP上昇 | 記載場所 | その他の副作用 |
| | 頻度 | 5%未満 |

5. 蕁麻疹、胸部圧迫感、動悸、血圧上昇、血圧低下、食欲不振、下痢、口渇、胸やけ、口内炎、腹部膨満感、ふらつき、めまい、頭痛、耳鳴、視覚異常、かすみ目、口内しびれ感、低リン血症、低ナトリウム血症、発赤、腫脹、発汗、頻尿、浮腫、咽喉部異和感、咽喉部ハッカ様爽快感、発熱、悪寒、脱力感、ヘモグロビン減少、あくび、尿白濁	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
6. ショック、乳汁分泌量が減少、新生仔体重増加抑制、下垂体腫瘍	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. がん	記載場所	使用上の注意
	頻度	5%未満

エルシトニン注20Sディスプレイの相互作用

1. 薬剤名等：ビスホスホネート系製剤

発現事象 血清カルシウムが急速に低下、高度の低カルシウム血症

投与条件 -

理由・原因 両剤のカルシウム低下作用

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『DIR』