

## 商品名 エポジン注シリンジ1500 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	エポエチン ベータ（遺伝子組換え）キット
英名	Epogin	剤型	キット類
薬価	465.00	規格	1,500国際単位0.5mL 1筒
メーカー	中外製薬	毒劇区分	(劇)

### エポジン注シリンジ1500の効能・効果

透析施行中の腎性貧血、透析導入前の腎性貧血、手術施行の自己血貯血、未熟児貧血

### エポジン注シリンジ1500の使用制限等

1. 造血機能障害	記載場所	効能・効果
	注意レベル	禁止
2. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
3. 鉄欠乏時、心筋梗塞又はその既往、脳梗塞又はその既往、肺梗塞又はその既往、血栓塞栓症又はその恐れ・疑い、高血圧症、薬物過敏症の既往、アレルギーを起こしやすい体質、脳室内出血を有する未熟児、脳実質内出血を有する未熟児、虚血性心疾患、心不全、2型糖尿病	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

### エポジン注シリンジ1500の副作用等

1. 頭痛、意識障害、痙攣、高血圧性脳症、高血圧性脳出血	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. ショック、アナフィラキシー、蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、咽頭浮腫、心筋梗塞、肺梗塞、脳梗塞、AST上昇、ALT上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、肝機能障害、黄疸、抗エリスロポエチン抗体産生、赤芽球癆	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
3. 血圧上昇、皮膚そう痒感、皮疹、嘔気、嘔吐、頭痛、頭重感、全身倦怠感、体熱感、ほてり感、発熱、血小板増多、血清カリウム上昇	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満

4. 動悸、ざ瘡、食欲不振、腹痛、下痢、めまい、発汗、不眠、筋肉痛、関節痛、好酸球増多、白血球増多、血中フィブリノゲン増加、腎機能障害増悪、BUN上昇、クレアチニン上昇、鼻出血、口内苦味感、眼底出血、網膜動脈血栓症、網膜静脈血栓症	記載場所	その他の副作用
	頻度	0.1%未満
5. 血圧上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
6. 高血圧性脳症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
7. 過度のヘモグロビン濃度上昇、過度のヘマトクリット値上昇	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
8. 循環器異常、脳血管異常	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 高カリウム血症、抗エリスロポエチン抗体産生、赤芽球癆、高血圧性脳症、死亡、心血管系障害、脳卒中、生存期間短縮、腫瘍進展、腫瘍局所再発、血栓塞栓症、未熟児網膜症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

## エボジン注シリンジ1500の配合変化

1. 薬剤名等：他剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 **禁止**

