

商品名 ゾメタ点滴静注4mg/100mL 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	ゾレドロン酸水和物注射液（1）
英名	Zometa	剤型	注射液
薬価	11905.00	規格	4mg 100mL 1瓶
メーカー	ノバルティス ファーマ	毒劇区分	(劇)

ゾメタ点滴静注4mg/100mLの効能・効果

悪性腫瘍による高カルシウム血症、(多発性骨髄腫、固形癌骨転移)の骨病変

ゾメタ点滴静注4mg/100mLの使用制限等

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. 類薬で過敏症の既往歴、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 禁止 |
| 2. 重篤な腎障害、悪性腫瘍による高カルシウム血症患者で血清クレアチニン4.5mg/dL以上、固形癌骨転移患者で血清クレアチニンが3.0mg/dL以上、多発性骨髄腫患者で血清クレアチニンが3.0mg/dL以上 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 慎重投与 |
| 3. 固形癌骨転移による骨病変で腎機能障害、多発性骨髄腫による骨病変で腎機能障害 | 記載場所 | 用法・用量 |
| | 注意レベル | 注意 |
| 4. 歯科処置の既往、悪性腫瘍、抜歯、放射線療法、顎骨に対する局所感染、化学療法、コルチコステロイド治療、口腔の不衛生、顎骨に対する侵襲的歯科処置、血管新生阻害薬治療、耳感染、耳外傷、固形癌骨転移による骨病変で投与前に腎機能障害、多発性骨髄腫による骨病変で投与前に腎機能障害、固形癌骨転移による骨病変で腎機能が正常、多発性骨髄腫による骨病変で腎機能が正常、固形癌骨転移による骨病変で腎障害、多発性骨髄腫による骨病変で腎障害 | 記載場所 | 使用上の注意 |
| | 注意レベル | 注意 |

ゾメタ点滴静注4mg/100mLの副作用等

- | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1. 急性腎障害、間質性腎炎、ファンコニー症候群、低リン血症、低カリウム血症、代謝性アシドーシス、近位腎尿細管障害、腎障害 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| 2. 間質性肺炎、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音異常、捻髪音 | 記載場所 | 重大な副作用 |
| | 頻度 | 頻度不明 |

3. うっ血性心不全、浮腫、呼吸困難、肺水腫、顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下非定型骨折、近位大腿骨骨幹部非定型骨折、近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
4. QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識、低カルシウム血症	記載場所	重大な副作用
	頻度	5%未満
5. 低リン酸血症、頭痛、嘔気、肝機能異常、AST増加、ALT増加、 γ -GTP増加、関節痛、骨痛、尿中 β 2-ミクログロブリン増加、発熱、けん怠感	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
6. 血小板減少、白血球減少、汎血球減少、過敏症、紅斑性皮疹、斑状皮疹、血管神経性浮腫、蕁麻疹、低マグネシウム血症、高ナトリウム血症、不安、睡眠障害、錯乱、幻覚、錯感覚、知覚過敏、振戦、傾眠、霧視、ブドウ膜炎、上強膜炎、強膜炎、眼窩炎症、眼窩浮腫、眼窩蜂巣炎、徐脈、低血圧、高血圧、咳嗽、消化不良、口内乾燥、全身痛、急性期反応、注射部位反応、注射部位疼痛、注射部位刺激感、注射部位腫脹、注射部位硬結、注射部位発赤、体重増加、多汗、インフルエンザ様疾患	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
7. 貧血、紅斑、水疱、皮疹、湿疹、そう痒、低カリウム血症、高カリウム血症、浮動性めまい、味覚異常、感覚減退、結膜炎、結膜充血、呼吸困難、下痢、便秘、腹痛、食欲不振、嘔吐、口内炎、歯周病、歯肉炎、歯周炎、関節硬直、筋肉痛、筋硬直、背部痛、血尿、多尿、蛋白尿、血中尿素増加、血中クレアチニン増加、 β -Nアセチル-D-グルコサミニダーゼ増加、脱力、疲労、浮腫、末梢性浮腫、胸痛、疼痛、悪寒、口渇、関節炎、関節腫脹	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
8. 低カルシウム血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
9. 大腿部痛、鼠径部痛、前腕部痛、前駆痛	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
10. 片側非定型骨折	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明
11. 急性腎障害、腎機能悪化、顎骨壊死、顎骨骨髓炎、外耳道骨壊死、非外傷性大腿骨転子下非定型骨折、軽微な外力による大腿骨転子下非定型骨折、非外傷性近位大腿骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位大腿骨骨幹部非定型骨折、非外傷性近位尺骨骨幹部非定型骨折、軽微な外力による近位尺骨骨幹部非定型骨折、非定型骨折、血清クレアチニンが投与前値から1.0mg/dL以上上昇、血清クレアチニンが投与前値から0.5mg/dL以上上昇、催奇形性、母動物死亡、著明な低カルシウム血症	記載場所	使用上の注意
	頻度	頻度不明

ゾメタ点滴静注4mg/100mLの相互作用

1. 薬剤名等：化学療法

発現事象 顎骨壊死、顎骨骨髓炎

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

2. 薬剤名等：血管新生阻害薬治療

発現事象 顎骨壊死、顎骨骨髓炎

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

3. 薬剤名等：コルチコステロイド治療

発現事象 顎骨壊死、顎骨骨髓炎

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

4. 薬剤名等：放射線療法

発現事象 顎骨壊死、顎骨骨髓炎

理由・原因 -

投与条件 -

指示 注意

5. 薬剤名等：カルシトニン製剤

発現事象 血清カルシウムが急速に低下

理由・原因 相互に作用を増強

投与条件 -

指示 注意

6. 薬剤名等：アミノグリコシド系抗生物質

発現事象 長期間にわたり血清カルシウムが低下

理由・原因 相互に作用を増強

投与条件 -

指示 注意

7. 薬剤名等：シナカルセト

発現事象 血清カルシウムが低下

理由・原因 相互に作用を増強

投与条件 -

指示 注意

ゾメタ点滴静注4mg/100mLの配合変化

1. 薬剤名等：カルシウムを含有する点滴用液

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：マグネシウムを含有する点滴用液

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 -

指示 禁止

3. 薬剤名等：他の点滴用液

発現事象 -

理由・原因 -

投与条件 減量して投与する場合を除き

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.