

商品名 トレムフィア点滴静注200mg 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	グセルクマブ（遺伝子組換え）注射液
英名	Tremfya	剤型	注射液
薬価	253045.00	規格	200mg 20mL 1瓶
メーカー	ヤンセンファーマ	毒劇区分	(劇)

トレムフィア点滴静注200mgの効能・効果

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法

トレムフィア点滴静注200mgの使用制限等

1. 重篤な感染症、活動性結核、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	禁止
2. 結核の既往、感染症＜重篤な感染症を除く＞又はその恐れ・疑い、結核又はその恐れ・疑い、肺外結核の既往、胸部画像検査で陳旧性結核又はその恐れ・疑い、結核既感染又はその恐れ・疑い、結核患者との濃厚接触歴、局面型皮疹を有する乾癬、掌蹠膿疱症、乾癬	記載場所	使用上の注意
	注意レベル	注意

トレムフィア点滴静注200mgの副作用等

1. 重篤な感染症、アナフィラキシー、血管浮腫、蕁麻疹、発疹、重篤な過敏症	記載場所	重大な副作用
	頻度	頻度不明
2. 白癬感染、胃腸炎	記載場所	その他の副作用
	頻度	頻度不明
3. 気道感染、単純ヘルペス、頭痛、下痢、関節痛、トランスアミナーゼ上昇、好中球数減少	記載場所	その他の副作用
	頻度	5%未満
4. 抗グセルクマブ抗体陽性	記載場所	使用上の注意

5. 結核症

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

6. 感染症、結核活動化、悪性腫瘍、重篤な感染症、感染、感染症増悪、皮膚悪性腫瘍、悪性腫瘍＜非黒色腫皮膚癌を除く＞、非黒色腫皮膚癌

記載場所	使用上の注意
頻度	頻度不明

7. 中和抗体、抗グセルクマブ抗体陽性、悪性腫瘍＜非黒色腫皮膚癌を除く＞、非黒色腫皮膚癌

記載場所	使用上の注意
頻度	5%未満

トレムフィア点滴静注200mgの相互作用

1. 薬剤名等：生物製剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：ヤヌスキナーゼ阻害剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

3. 薬剤名等：スフィンゴシン1-リン酸受容体調節剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

4. 薬剤名等：生ワクチン

発現事象 感染症

投与条件 -

理由・原因 リスクを否定できない

指示 禁止

トレムフィア点滴静注200mgの配合変化

1. 薬剤名等：他の薬剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』

Copyright© 2005-2025 e-pharma All rights reserved.