

## 商品名 スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 医薬品基本情報

薬効	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	一般名	リサンキズマブ（遺伝子組換え）キット（1）
英名	Skyrizi	剤型	キット類
薬価	233885.00	規格	75mg 0.83mL 1筒
メーカー	アヅヴィ	毒劇区分	（劇）

## スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mLの効能・効果

乾癬性紅皮症、掌蹠膿疱症、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性関節炎

## スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mLの使用制限等

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. 重篤な感染症、活動性結核、本剤成分又は含有成分で過敏症の既往歴  | 記載場所  | 使用上の注意 |
|   | 注意レベル | 禁止     |
| 2. 結核の既往、感染症<重篤な感染症を除く>又はその恐れ・疑い、結核又はその恐れ・疑い、肺外結核の既往、胸部画像検査で陳旧性結核又はその恐れ・疑い、結核既感染又はその恐れ・疑い、結核患者との濃厚接触歴 | 記載場所  | 使用上の注意 |
|   | 注意レベル | 注意     |

## スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mLの副作用等

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. 重篤な感染症、敗血症、骨髄炎、腎盂腎炎、細菌性髄膜炎、アナフィラキシー、重篤な過敏症                              | 記載場所 | 重大な副作用  |
|  | 頻度   | 5%未満    |
| 2. 上気道感染、白癬感染、毛包炎、頭痛、注射部位反応、注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位そう痒感、注射部位疼痛、注射部位出血、注射部位硬結、疲労 | 記載場所 | その他の副作用 |
|  | 頻度   | 5%未満    |
| 3. 抗リサンキズマブ抗体、中和抗体   | 記載場所 | 使用上の注意  |
| 4. 結核症   | 記載場所 | 使用上の注意  |
|  | 頻度   | 頻度不明    |
| 5. 感染症、結核活動化、悪性腫瘍、重篤な感染症、感染、感染症増悪、皮膚悪性腫瘍                                   | 記載場所 | 使用上の注意  |
|  | 頻度   | 頻度不明    |

6. 悪性腫瘍<非黒色腫皮膚癌を除く>、非黒色腫皮膚癌

記載場所 使用上の注意

頻度 5%未満

## スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mLの相互作用

1. 薬剤名等：生物製剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 禁止

2. 薬剤名等：生ワクチン

発現事象 感染症

投与条件 -

理由・原因 リスクを否定できない

指示 禁止

3. 薬剤名等：免疫抑制剤

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意

4. 薬剤名等：光線療法

発現事象 -

投与条件 -

理由・原因 -

指示 注意



薬学をはじめとする専門知識と情報処理技術が実現する高い信頼性と豊富な情報量

医薬品データベースの決定版 『 DIR 』